

《石原の農薬登録情報》

(平成25年10月23日付)

フルチャージ1キロ粒剤 (カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン粒剤)

登録番号22394号

<適用拡大の概要>

1. 作物名「移植水稻」について、適用地帯「九州の普通期及び早期栽培地帯」の適用土壌「壤土～埴土」を「移植後5日～ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで」に変更する。
2. 作物名「直播水稻」の使用時期「イネ1葉期～ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで」を「稲1葉期～ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで」に変更する。
(イネの記述を「イネ」⇒「稲」に変更する。)

(下線部が変更点)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10アール当り 使用量	本剤の 使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 および マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ(東北) ウリカワ クログワイ(九州を除く) オモダカ(九州を除く) ヒルムシロ セリ コウキヤガラ(北陸を除く) シズイ(東北)	移植後5日～ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで	壤土～埴土	1kg	1回	湛水散布 又は無人ヘ リコプター による散布	近畿・中国・ 四国、 <u>九州</u> の 普通期及び早 期栽培地帯
		移植後7日～ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで	砂壤土				東北、北陸、 関東・東山・ 東海の普通 期および早期 栽培地帯
直播水稻	水田一年生雑草 および マツバイ ホタルイ ウリカワ セリ	<u>稲</u> 1葉期～ノビエ4葉期 但し収穫45日前まで	砂壤土～埴土			湛水散布	全域(北海道 を除く)

カルフェントラゾンエチルを含む農薬の総使用回数	2回以内
フルセトスルフロンを含む農薬の総使用回数	2回以内

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>

- 農薬登録申請書等8項「使用上の注意事項」のうち、(6)を以下のとおり変更する。
 (6) 本剤を直播水稻に使用する場合、使用時期は稲の1葉期からノビエの4葉期までなので、時期を失ないように散布すること。
 なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布するように注意すること。
 ホタルイ4葉期まで、ウリカワ2葉期まで、セリ再生前～再生始期までが本剤の散布適期である。
 (イネの記述を「イネ」⇒「稲」に変更する。)

石原バイオサイエンス(株)