

フルイニング 1キロ粒剤

登録番号22621号

(カフェンストロール・カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン・ベンゾビシクロン粒剤)
適用拡大の概要

<適用雑草名の追加>

「移植水稻」に「コウキヤガラ(東北)」を追加し、「コウキヤガラ(北海道、北陸を除く)」に変更する。

 (**下線部**が変更点)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ	移植後7日 ～ノビエ4葉期 但し 移植後30日まで	壤土 ～ 埴土	1kg/10a	1回	湛水散布	北海道
	ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北) ミズガヤツリ (北海道を除く)	移植後7日 ～ノビエ4葉期 但し 収穫60日前まで	砂壤土 ～ 埴土				東北、北陸、 関東・東山・東海の 普通期及び 早期栽培地帯
	ウリカフ クログワイ (北海道を除く) オモダカ (北海道を除く)	移植後5日 ～ノビエ4葉期 但し 収穫60日前まで	壤土 ～ 埴土				近畿・中国・四国の 普通期及び 早期栽培地帯
	ヒルムシロ セリ コウキヤガラ (北海道、北陸を除く)	移植後7日 ～ノビエ4葉期 但し 収穫60日前まで	砂壤土				
	シズイ (東北) アオミドロ・藻類による表層はく離 (九州)	移植後5日 ～ノビエ4葉期 但し 移植後30日まで	砂壤土 ～ 埴土				九州の 普通期及び 早期栽培地帯

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加> なし