

**フルパワーMX1キロ粒剤** (ピラクロニル・フルセトスルフロン・メソトリオン粒剤)

登録番号: 第23425号

適用拡大の概要

<水稲用除草剤の登録における適用土壌、適用地帯の区分が廃止となったことによる変更>

- ・適用土壌、適用地域の欄を削除する。
- ・適用雑草名から地域の記載を削除する。

<適用雑草名の追加>

- ・作物名「移植水稲」について、適用雑草名に「シズイ」を追加する。

<使用時期の変更>

- ・作物名「直播水稲」について、使用時期を「稲1葉期～ノビエ3葉期 但し収穫90日前まで」から「稲1葉期～ノビエ3.5葉期 但し収穫90日前まで」に変更する。

(**下線部**が変更点)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ <b>ヘラオモダカ</b> <b>ミズガヤツリ</b> ウリカワ <b>クログワイ</b> <b>オモダカ</b> ヒルムシロ <b>セリ</b> <b>コウキヤガラ</b> <b>エゾノサヤマカグサ</b> <b>シズイ</b> <b>アオミドロ・藻類による表層はく離</b>	移植後5日～ ノビエ3.5葉期 但し 移植後30日まで	1kg/10a	1回	湛水散布 又は 無人ヘリコ プターによる 散布
直播水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	<b>稲1葉期～</b> <b>ノビエ3.5葉期</b> <b>但し</b> <b>収穫90日前まで</b>			

ピラクロニルを含む農薬の 総使用回数	フルセトスルフロンを含む農薬の 総使用回数	メソトリオンを含む農薬の 総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

<使用上の注意事項の変更・追加>

- (2) 本剤を移植水稲に使用する場合、使用時期は、ノビエの3.5葉期までなので、時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。**ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワは3葉期まで**、オモダカは発生始期まで、クログワイ、コウキヤガラは草丈10cmまで、**シズイは草丈3cmまで**、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前～再生始期まで、エゾノサヤマカグサは2葉期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前までが本剤の散布適期である。
- (3) オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、**シズイ**は発生期間が長く生育段階によって効果にフレがあるので、**必要に応じて**有効な後処理剤との組み合わせで使用すること。
- (4) 本剤を直播水稲に使用する場合、使用時期は、稲の1葉期からノビエの**3.5**葉期までなので、時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイ、ミズガヤツリは3葉期まで、ウリカワは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前～再生始期までが本剤の散布適期である。
- (5) 直播水稲の稲の根が露出した条件下では薬害を生じるおそれがあるので、使用を**さける**こと。