

トアロー水和剤CT  
(BT水和剤)

登録番号: 第14459号

適用拡大の概要

<本剤の使用回数の変更>

・作物名「たばこ」の本剤の使用回数を「2回以内」から「4回以内」に変更する。

<使用液量欄の追加>

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	散布液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BTを含む農薬の総使用回数
雑穀類 (ひえを除く)	アワノメイガ	1000倍	<u>60~</u> <u>150L/10a</u>	発生初期 但し 収穫前日まで	-	散布	-
ひえ		500~ 1000倍					
	イネヨトウ	1000倍					
野菜類 (パセリ、えごま(葉)を除く)	ヨトウムシ	500~ 1000倍	<u>100~</u> <u>300L/10a</u>				
パセリ	アオムシ コナガ	1000~ 2000倍					
	ハスモンヨトウ	500倍					
えごま(葉)	ヨトウムシ	500~ 1000倍					
	アオムシ コナガ	1000~ 2000倍					
えごま(種子)	ベニフキノメイガ	1000倍					
果樹類 (りんごを除く)	ハマキムシ類	500~ 1000倍	<u>200~</u> <u>700L/10a</u>				
りんご	ヒメシロモンドクガ						
茶	チャノコカクモンハマキ ヨモギエダシャク		<u>200~</u> <u>400L/10a</u>	発生初期 但し 摘採7日前まで			
たばこ	アオムシ	1000~ 2000倍	<u>25~</u> <u>180L/10a</u>	発生初期 但し 収穫3日前まで	<u>4回以内</u>		
	ヨトウムシ	500~ 1000倍					
樹木類 (つばき類を除く)	アメリカシロヒトリ	1000~ 2000倍	<u>200~</u> <u>700L/10a</u>	発生初期	-		
つばき類	イラガ類	1000倍					
	アメリカシロヒトリ	1000~ 2000倍					
つばき類	イラガ類	1000倍					
	チャドクガ						
ストック	コナガ		<u>100~</u> <u>300L/10a</u>				

<使用上の注意事項の変更・追加>なし