

フルチャージジャンボ

登録番号: 第22396号

(カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン粒剤)

適用拡大の概要

＜水稻用除草剤の登録における適用土壌、適用地帯の区分が廃止となったことによる変更＞

- ・適用土壌、適用地帯の欄を削除する。
- ・適用雑草名から地域の記載を削除する。

(下線部が変更点)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ クログワイ オモダカ コウキヤガラ シズイ ヒルムシロ セリ	移植後5日～ ノビエ4葉期 但し収穫45日前 まで	小包装 (パック) 10個 (500g) /10a	1回	水田に小包装 (パック)のまま 投げ入れる
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ4葉期 但し収穫45日前 まで			

カルフェントラゾンエチルを含む 農薬の総使用回数	フルセトスルフロンを含む 農薬の総使用回数
2回以内	2回以内

＜使用上の注意事項の変更・追加＞

次ページに記載

## フルチャージジャンボ

登録番号: 第22396号

## (カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン粒剤)

## ＜使用上の注意事項の変更・追加＞

- (2) 本剤を移植水稻に使用する場合、使用時期はノビエの4葉期までなので、時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレがでるので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイ、**ヘラオモダカ**、**ウリカワ**は4葉期まで、クログワイは草丈10cmまで、オモダカは矢じり葉抽出前まで、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈3cmまで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前～再生始期まで、**また、クサネムは2葉期まで**が本剤の散布適期である。
- (5) 本剤を直播水稻に使用する場合、使用時期は稲の1葉期からノビエの4葉期までなので、時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレがでるので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイ、**ウリカワ**は2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前～再生始期までが本剤の散布適期である。
- (8) 以下のような条件下では薬害が発生する**おそれ**があるので使用をさけること。
- 「(8) -4) 散布後低温傾向が続くことで稲の生育が著しく停滞すると予想される場合」**を追加する。**