

ガードホープ液剤
(ホスチアゼート液剤)

登録番号: 第22114号

適用拡大の概要

＜作物名の追加＞

・作物名「しょうが(ネコブセンチュウ)」を追加する。

＜使用方法、使用液量の変更＞

・作物名「トマト、ミニトマト、すいか、メロン、にがうり、にんにく、茶(幼木)、きく、ぼたん」の使用方法「1㎡当り2ℓ土壌灌注」を「土壌灌注」に変更し、該当する使用液量を「2ℓ/㎡」に変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ホスチアゼートを含む農薬の総使用回数
トマト ミニトマト	ネコブセンチュウ トマトサビダニ	4000倍	<u>2ℓ/㎡</u>	収穫前日まで	1回	<u>土壌灌注</u>	2回以内 (定植前の土壌混和は1回以内、土壌灌注は1回以内)
すいか	ネコブセンチュウ			収穫14日前まで			
メロン				収穫28日前まで			
にがうり				生育期 但し、 収穫14日前まで			
にんにく	イモグサレセンチュウ	3000倍	—	収穫60日前まで		30分間 球根浸漬	3回以内 (植付前の土壌混和は1回以内、球根浸漬は1回以内、土壌灌注は1回以内)
	チューリップサビダニ	500倍	—	植付前			
<u>しょうが</u>	ネコブセンチュウ	4000倍	2ℓ/㎡	収穫3日前まで	—	土壌灌注	2回以内 (植付前の土壌混和は1回以内、土壌灌注は1回以内)
茶 (幼木)	ネコブセンチュウ	2000倍	<u>2ℓ/㎡</u>	生育期 但し、 摘採1年半前まで	2回以内	<u>土壌灌注</u>	2回以内
きく	ネグサレセンチュウ ハガレセンチュウ ナミハダニ	3000倍	—	生育期	1回	10分間 根鉢浸漬	3回以内 (定植前の土壌混和は1回以内、生育期の根鉢浸漬は1回以内、土壌灌注は1回以内)
ぼたん	ネコブセンチュウ	2000倍	—				
		3000倍	<u>2ℓ/㎡</u>			<u>土壌灌注</u>	

(該当作物のみ記載。)

＜使用上の注意事項の変更・追加＞ なし