

**スケダチエース1キロ粒剤
(フルセトスルフロン粒剤)**

登録番号: 第23615号

適用拡大の概要

＜適用雑草名の追加＞

・作物名「移植水稻」について、適用雑草名に「クログワイ」「コウキヤガラ」を追加する。

＜使用方法の変更＞

・作物名「移植水稻」について、使用方法を「湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布」に変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	フルセトスルフロンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	ノビエ マツバイ ウリカワ ヒルムシロ ヘラオモダカ <u>クログワイ</u> <u>コウキヤガラ</u>	移植後14日 ～ ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで	1 kg/ 10a	2回以内	湛水散布 <u>又は無人ヘリコプターによる散布</u>	2回以内

＜使用上の注意事項の変更・追加＞

(3) 本剤の使用時期は、ノビエ5葉期までなので、時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布するように注意すること。ウリカワは4葉期、クログワイ、コウキヤガラは草丈 15 cm、ヒルムシロは発生期までが本剤の散布適期である。

(4)、(11)を追記し以降を繰り下げる。

(4) クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く生育段階によって効果にフレが出るので必要に応じて有効な前処理剤との組み合わせで使用する。

(11) 本剤を無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は、次の注意を守ること。

1) 散布は散布機種種の散布基準に従って実施すること。

2) 散布機種種に適合した散布装置を使用すること。

3) 粒剤散布装置については、事前に薬剤の物理性に合せてメタリング開度を調整すること。

4) 当該水田周辺部への飛散防止のため、散布装置のインペラ(スピンナ)の回転を低速に調整すること。

5) 散布薬剤の飛散によって他の作物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、圃場の端から5m以上離れた位置から圃場内に散布すること。

6) 水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意すること。