

ランマンフロアブル
(シアゾファミド水和剤)

登録番号: 第20624号

適用拡大の概要

＜使用方法の追加・総使用回数の変更＞

作物名「みょうが(花穂)」及び「みょうが(茎葉)」に、使用方法「30分間種根茎浸漬」を追加し、シアゾファミドを含む農薬の総使用回数を「4回以内(種根茎浸漬は1回以内、土壌灌注は3回以内)」に変更する。

＜使用方法の変更＞

作物名「はくさい」及び「キャベツ」、適用病害虫名「根こぶ病」の希釈倍数「2000倍」使用液量「250ml/株」の使用方法を「灌注」から「株元灌注」に変更する。

＜総使用回数の変更＞

作物名「はくさい」及び「キャベツ」のシアゾファミドを含む農薬の総使用回数を「6回以内(育苗期の灌注は1回以内、本圃での灌注は1回以内、散布は4回以内)」から、「6回以内(育苗期の灌注は1回以内、本圃での株元灌注は1回以内、散布は4回以内)」に変更する。

＜使用方法の変更＞

作物名「いちご」の使用方法を「土壌灌注」から「株元灌注」に変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアゾファミドを含む農薬の総使用回数
みょうが(花穂)	根茎腐敗病	500倍	3L/m ²	生育期 但し、収穫3日前まで	3回以内	土壌灌注	4回以内 (種根茎浸漬は1回以内、 土壌灌注は3回以内)
みょうが(茎葉)		<u>200倍</u>	<u>二</u>	<u>植付前</u>	<u>1回</u>	<u>30分間種根茎浸漬</u>	
はくさい	ピシウム腐敗病	2000倍	100~300L /10a	収穫3日前まで	4回以内	散布	6回以内 (育苗期の灌注は1回以内、本圃での株元灌注は1回以内、散布は4回以内)
	べと病		250ml/株	収穫14日前まで		株元灌注	
キャベツ	根こぶ病	500倍	セル成型育苗トレイ1箱またはパーパレット1冊(30x60cm、使用土壌約2.5~7L) 当り2L	定植前日~当日	1回	灌注	
	べと病	2000倍	250ml/株	収穫14日前まで		株元灌注	
いちご	疫病	500~1000倍	50ml/株	育苗期	2回以内	株元灌注	4回以内 (育苗期は2回以内、定植後は2回以内)
			100ml/株	生育期 但し、収穫30日前まで			

(該当作物のみ記載。)

＜使用上の注意事項の変更・追加＞

(8) あずき、だいず及びえだまめの種子塗沫に使用する場合は次の注意事項を守ること。