

石原フロンサイドSC
(フルアジナム水和剤)

登録番号: 第18750号

適用拡大の概要

<適用病害虫の追加>

- ・作物名「たまねぎ」に適用病害虫名「白色疫病」を追加する。
- ・作物名「キャベツ」に、適用病害虫名「苗立枯病(リゾクトニア菌)」を追加する。
- ・作物名「レタス 非結球レタス」使用方法「全面土壌散布」に、適用病害虫名「すそ枯病」を追加する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
たまねぎ	灰色腐敗病 べと病	1000~2000倍	100~ 300L/10a	収穫 3日前 まで	5回 以内	散布	6回以内 (苗根部浸漬は1 回以内、 散布は5回以内)
	灰色かび病	1000~2000倍					
		500倍	25L/10a				
	<u>白色疫病</u>	1000倍	100~ 300L/10a				

作物名	適用病害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
キャベツ	<u>苗立枯病</u> (<u>リゾクトニア菌</u>) 菌核病 根こぶ病	500ml/10a	100~200 L/10a	は種又は 定植前	2回以内 (苗床では1回 以内、本圃で は1回以内)	全面散布 土壌混和	2回以内 (苗床では1回以 内、本圃では1回 以内)
レタス 非結球 レタス	ビッグベイン病 すそ枯病	500ml/10a	100~200 L/10a	定植前	1回	全面散布 土壌混和	2回以内 (土壌混和は1回 以内、土壌散布 は1回以内)
	<u>すそ枯病</u> 軟腐病					全面土壌散布	

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>なし