

<p>プレキープフロアブル (ピラゾキシフェン・ベンゾビシクロン水和剤)</p>	<p>登録番号: 第22872号</p>
---	----------------------

適用拡大の概要

<水稲用除草剤の登録における適用土壌、適用地帯の区分が廃止となったことによる変更>

- ・適用土壌、適用地域の欄を削除する。
- ・適用雑草名から地域の記載を削除する。
- ・処理時期は最大範囲で統一する。

<使用方法の変更>

・移植水稲について、使用方法を「原液湛水散布」から「原液湛水散布又は無人ヘリコプターによる滴下」に変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び <u>マツバイ</u> ホタルイ <u>ヘラオモダカ</u> <u>ミズガヤツリ</u> <u>ウリカワ</u> <u>ヒルムシロ</u>	<u>植代後～移植7日前</u> または <u>移植直後～</u> <u>ノビエ1葉期</u> <u>但し移植後30日まで</u>	300～500 mL/10a	1回	<u>原液湛水散布</u> 又は <u>無人ヘリコプターによる滴下</u>
直播水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	<u>湛水直播の代かき後</u> <u>～は種7日前</u> または <u>は種直後</u> <u>～ノビエ1葉期</u> <u>但し収穫90日前まで</u>			
		は種時			は種同時散布機 で施用

ピラゾキシフェンを含む農薬の総使用回数	ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内

<使用上の注意事項の変更・追加>

次ページに記載

プレキープフロアブル
(ピラゾキシフェン・ベンゾビシクロン水和剤)

登録番号: 第22872号

＜使用上の注意事項の変更・削除＞

- (4) 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの1葉期までに時期を失しないように散布すること。
なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。
ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワは発生始期まで、ヒルムシロは発生期までが本剤の散布適期である。
- (9) 以下のような条件下では薬害が発生するおそれがあるので使用をさけること。
- (11) 本剤はその殺草特性からいぐさの生育を阻害するおそれがあるので、いぐさの生育期に隣接田で使用する場合は、十分注意すること。
- 「(14)4)隣接する圃場に水稻以外の作物が栽培されている場合は、無人ヘリコプターによる本剤の滴下は行わないこと。」を削除し、以下繰り上げる。
- (14) 4) 水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意すること。
5) 薬剤滴下に使用した装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。
6) 本剤の滴下に使用した無人ヘリコプターの散布装置は、水稻以外の作物への薬剤散布には使用しないこと。