

**センイチMX1キロ粒剤** 登録番号: 第23191号  
**(ピラクロニル・フルセトスルフロン・メソトリオン粒剤)**

適用拡大の概要

<使用時期の変更>

- ・作物名「移植水稻」について、使用時期を「移植後5日～レ<sup>1</sup>3.5葉期 但し移植後30日まで」から「移植後5日～レ<sup>1</sup>3.5葉期 但し収穫60日前まで」に変更する。
- ・作物名「直播水稻」について、使用時期を「稲1葉期～レ<sup>1</sup>3.5葉期 但し収穫90日前まで」から「稲1葉期～レ<sup>1</sup>3.5葉期 但し収穫60日前まで」に変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ コウキヤガラ エゾノサヤヌカグサ シズイ アオミドロ・藻類による表層はく離	<u>移植後5日～ レ<sup>1</sup>3.5葉期 但し収穫60日前まで</u>	1kg/10a	1回	湛水散布 又は 無人ヘリコ プターによ る散布
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	<u>稲1葉期～ レ<sup>1</sup>3.5葉期 但し収穫60日前まで</u>			

ピラクロニルを含む農薬の 総使用回数	フルセトスルフロンを含む 農薬の総使用回数	メソトリオンを含む農薬の 総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

<使用上の注意事項の変更・追加>

「(4)前処理剤との体系で使用する場合には、雑草の発生状況をよく観察し、時期を失ないように適期に散布すること。」を追加し、以下繰り下げる。

(6)直播水稻の稲の根が露出する条件下では薬害を生じるおそれがあるので、使用をさけること。

(15)6)水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意すること。