

フルパワーMXジャンボ

登録番号: 第23767号

(ピラクロニル・フルセトスルフロン・メソトリオン粒剤)

適用拡大の概要

<適用雑草名の追加>

作物名「移植水稻」について、適用雑草名に「シズイ」を追加する。

(下線部が変更点)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ コウキヤガラ <u>シズイ</u> エゾノサヤヌカグサ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後5日～ ルビエ3.5葉期 但し収穫60日前まで	小包装 (パック) 10個(500g) /10a	1回	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ルビエ3.5葉期 但し収穫60日前まで			

ピラクロニルを含む農薬の総使用回数	フルセトスルフロンを含む農薬の総使用回数	メソトリオンを含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

<使用上の注意事項の変更・追加>

(2) 本剤の使用時期は、ルビエの3.5葉期までなので、時期を失ないように散布すること。  
 なお多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイは4葉期まで、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワは3葉期まで、オモダカは発生始期まで、クログワイ、コウキヤガラは草丈10cmまで、シズイは草丈3cmまで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前～再生始期まで、エゾノサヤヌカグサは2葉期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前までが本剤の散布適期である。

(3) オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く生育段階によって効果にフレがあるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用すること。