

**スケダチエース1キロ粒剤
(フルセトスルフロン粒剤)**

登録番号: 第23615号

適用拡大の概要

＜適用雑草名の追加＞

・作物名「移植水稻」に、適用雑草名「シズイ」を追加する。

＜作物名の追加＞

・作物名「直播水稻」を追加する。

(下線部が変更点)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	フルセトスルフロンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	ノビエ マツバイ ウリカワ ヒルムシロ ヘラオモダカ クログワイ コウキヤガラ <u>シズイ</u>	移植後14日～ ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで	1kg/ 10a	2回以内	湛水散布 又は 無人ヘリコプター による散布	2回以内
<u>直播水稻</u>	ノビエ ウリカワ	稲2葉期～ ノビエ5葉期 但し収穫45日前まで				

＜使用上の注意事項の変更・追加＞

- (2) 本剤を移植水稻に使用する場合は前処理剤との体系、直播水稻に使用する場合は前処理剤または後処理剤との体系で使用する。
- (3) 本剤を移植水稻に使用する場合は、使用時期はノビエの5葉期までなので、時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布するように注意すること。ウリカワ、ヘラオモダカは4葉期、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは草丈15cm、ヒルムシロは発生期までが本剤の散布適期である。
- (4) クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く生育段階によって効果にフレが出るので必要に応じて有効な前処理剤との組み合わせで使用する。
- (5)を追記し、以降を繰り下げる。
- (5) 本剤を直播水稻に使用する場合は、使用時期はノビエの5葉期までなので、時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布するように注意すること。ウリカワは4葉期までが本剤の散布適期である。