

フルイニングジャンボ

登録番号: 第23174号

(カフェンストール・カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン・ベンゾビシクロン粒剤)

適用拡大の概要

＜作物名の追加＞

- ・作物名「直播水稻」を追加する。

(下線部が変更点)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
<u>直播水稻</u>	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ4葉期 但し収穫60日前まで	小包装 (パック) 10個 (500g)/10a	1回	水田に小包装 (パック)のまま 投げ入れる。

カフェンストールを含む 農薬の総使用回数	カルフェントラゾンエチルを含む 農薬の総使用回数	フルセトスルフロンを含む 農薬の総使用回数	ベンゾビシクロンを含む 農薬の総使用回数
1回	2回以内	2回以内	2回以内

(該当作物のみ記載。)

＜使用上の注意事項の変更・追加＞

- (3) 本剤を移植水稻に使用する場合、使用時期はノビエの4葉期までなので、時期を失ないように散布すること。なお多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワは4葉期まで、クログワイは草丈10cmまで、オモダカは矢じり葉抽出前まで、シズイは草丈3cmまで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前～再生始期まで、コウキヤガラは発生始期までが本剤の散布適期である。

(5)を追記し、以降を繰り下げる。

- (5) 本剤を直播水稻に使用する場合、使用時期はノビエの4葉期までなので、時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイは4葉期まで、ウリカワは3葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期までが本剤の散布適期である。