

**石原フロンサイドSC  
(フルアジナム水和剤)**

登録番号: 第18750号

適用拡大の概要

<薬量の追加>

・作物名「ばれいしょ」適用病害虫名「粉状そうか病」に、薬量「400ml/10a」を追加する。

<適用病害虫名・使用方法の追加>

・作物名「ばれいしょ」適用病害虫名「粉状そうか病」に、使用方法「植溝散布」を追加する。

・作物名「ばれいしょ」に、適用病害虫名「そうか病」、使用方法「植溝散布」を追加する。

<総使用回数の変更>

・作物名「ばれいしょ」のフルアジナムを含む農薬の総使用回数を「6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和は1回以内、散布は4回以内)」から「6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内)」へ変更する。

<適用病害虫名の追加>

・作物名「小麦」に適用病害虫名「縞萎縮病」を追加する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	疫病	500倍	25L/10a	収穫 7日前 まで	4回 以内	散布	<b>6回以内</b> <b>(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内)</b>
	灰色かび病	1000~2000倍	100~ 300L/10a				
	菌核病	1000倍					
	夏疫病	2000倍					
	そうか病	100倍	-	植付前	1回	種いも瞬間 浸漬	

作物名	適用病害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
ばれいしょ	粉状そうか病	<b>400~600ml</b> <b>/10a</b>	100~200 L/10a	植付前	1回	全面散布 土壌混和	<b>6回以内</b> <b>(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内)</b>
	<b>粉状そうか病</b> <b>そうか病</b>	<b>200ml/10a</b>	<b>20L/10a</b>	<b>植付時</b>		<b>植溝散布</b>	
小麦	<b>縞萎縮病</b>	<b>600ml/10a</b>	<b>100L/10a</b>	<b>は種前</b>	<b>1回</b>	<b>全面散布</b> <b>土壌混和</b>	<b>3回以内</b> <b>(は種前は1回以内、は種後は2回以内)</b>

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>なし