

ランマンフロアブル
(シアゾファミド水和剤)

登録番号: 第20624号

適用拡大の概要

<作物名の追加>

作物名「日本なし」「カリフラワー」を追加する。

<使用方法の追加、総使用回数の変更>

作物名「ブロッコリー」の適用病害虫名「根こぶ病」に使用方法「株元灌注」を追加し、シアゾファミドを含む農薬の総使用回数を「5回以内(育苗期の灌注は1回以内、本圃での株元灌注は1回以内、散布は3回以内)」に変更する。

<使用方法の変更>

作物名「小麦」及び「ばれいしょ」の使用方法「無人ヘリコプターによる散布」を「無人航空機による散布」に変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアゾファミドを含む農薬の総使用回数
<u>日本なし</u>	疫病	2000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
<u>カリフラワー</u>	根こぶ病	500倍	セル成型育苗トレイ1箱またはパーハート1冊(30×60cm、使用土壌約2.5～7L)当り2L	定植前日～当日	1回	灌注	6回以内 (育苗期の灌注は1回以内、本圃での株元灌注は1回以内、散布は4回以内)
		2000倍	250ml/株	収穫14日前まで	1回	株元灌注	
ブロッコリー	根こぶ病	500倍	セル成型育苗トレイ1箱またはパーハート1冊(30×60cm、使用土壌約2.5～7L)当り2L	定植前日～当日	1回	灌注	<u>5回以内</u> (<u>育苗期の灌注は1回以内、本圃での株元灌注は1回以内、散布は3回以内</u>)
		2000倍	<u>250ml/株</u>	<u>収穫14日前まで</u>	<u>1回</u>	<u>株元灌注</u>	
小麦	褐色雪腐病	1000倍	100L/10a	根雪前	3回以内	散布	3回以内
		250倍	25L/10a			<u>無人航空機による散布</u>	
		8倍	0.8L/10a				
ばれいしょ	疫病	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内
		375倍	25L/10a			<u>無人航空機による散布</u>	
		600倍	40L/10a				
		32倍	3.2L/10a				

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>

(10)を以下のとおり変更する。

(10)本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ること。