

《石原の農薬登録情報》

(平成24年 8月29日付)

フルチャージジャンボ(カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン粒剤)

登録番号22396号

＜適用拡大の概要＞

・作物名「移植水稻」に適用雑草名「シズイ(東北)」を追加

(下線部が変更点)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10a当り 使用量	本剤の 使用 回数	使用方法	適用地帯
移植 水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (東北) ウリカワ クログワイ (九州を除く) オモダカ (九州を除く) ヒルムシロ セリ コウキヤガラ (関東・東山・東 海、九州) <u>シズイ(東北)</u>	移植後5日 ～ノビエ4葉期 但し 収穫45日前まで	壤土～埴土	小包装 (パック) 10個 (500g)	1回	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる	近畿・中国・四国の 普通期及び早期栽培 地帯
		移植後7日 ～ノビエ4葉期 但し 収穫45日前まで	砂壤土				
			砂壤土 ～埴土				

カルフェントラゾンエチルを含む農薬の総使用回数	2回以内
フルセトスルフロンを含む農薬の総使用回数	2回以内

＜使用上の注意事項の変更・追加＞

「使用上の注意事項」について(2)、(3)を下記の通り変更する。

(2)本剤の使用時期は、ノビエの4葉期までなので、時期を失ないように散布すること。

なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレがでるので、必ず適期に散布するように注意すること。

ホタルイ4葉期(東北は3葉期)まで、ヘラオモダカ4葉期まで、ウリカワ3葉期(北陸は2葉期、九州は4葉期)まで、クログワイ草丈10cmまで、オモダカ矢じり葉抽出前まで、コウキヤガラ発生始期まで、シズイ草丈3cmまで、ヒルムシロ発生期まで、セリ再生前～再生始期までが本剤の散布適期である。

(3)オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、生育段階によって効果にフレがでるので有効な後処理剤との組み合わせで使用すること。

また、オモダカ、クログワイは有効な後処理剤との組み合わせで連年施用することによりさらに効果が向上する。

石原バイオサイエンス(株)