

《石原の農薬登録情報》

(平成24年 9月12日付)

石原フロンサイドSC (フルアジナム水和剤)

登録番号18750号

<適用拡大の概要>

- ・作物名「小麦」の適用病害虫名「雪腐小粒菌核病」の希釈倍数「1000倍」を「1000～2000倍」に変更する。
- ・作物名「いんげんまめ」を追加する。
- ・作物名「はくさい、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、レタス、非結球レタス、ばれいしょ」について、使用方法「全面散布後土壌混和」を「全面散布土壌混和」に変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルアジナム を含む農薬の 総使用回数
小麦	紅色雪腐病 雪腐大粒菌核病	1000倍	60～150L	根雪前	2回以内	散布	3回以内 (は種前は1回以内、 は種後は2回以内)
	雪腐小粒菌核病	<u>1000～2000倍</u>					
		250倍	25L				
<u>いんげんまめ</u>	<u>炭疽病</u> <u>灰色かび病</u>	<u>1000～2000倍</u>	<u>100～300L</u>	<u>収穫7日前まで</u>	<u>3回以内</u>	<u>散布</u>	<u>3回以内</u>
	<u>菌核病</u>	<u>1000倍</u>					

作物名	適用病害虫名	10アール当り 使用液量		使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルアジナム を含む農薬の 総使用回数
		薬量	希釈水量				
キャベツ	根こぶ病	500ml	100～150L	は種 又は 定植前	2回以内 <small>(苗床では1回以内、 本圃では1回以内)</small>	<u>全面散布 土壌混和</u>	2回以内 <small>(苗床では1回以内、 本圃では1回以内)</small>
はくさい ブロッコリー カリフラワー				定植前	1回		1回
レタス 非結球レタス				すそ枯病			
ばれいしょ	粉状そうか病	600ml	100L	植付前	1回		6回以内 <small>(種いも浸漬は1回以内、 植付前の土壌混和は1回 以内、 散布は4回以内)</small>

<使用上の注意事項の変更・追加>

「使用上の注意事項」の内、(12)について以下の通り変更する。

(12) 全面散布土壌混和で使用する場合、所定量の薬量を均一に散布し、土壌と十分混和すること。降雨直後の処理は、混和むらの原因となるので避けること。

石原バイオサイエンス(株)