

《石原の農薬登録情報》

(平成25年 2月13日付)

アージラン液剤 (アシュラム液剤)

登録番号12006号

＜適用拡大の概要＞

作物名「牧草」、適用地帯「北海道」の使用時期について、

- 「秋期経年草地のギンギン類の栄養生長期」を「秋期経年草地のギンギン類の栄養生長期 **但し、最終採草後**」に変更。
- 「秋期新播草地のギンギン類の栄養生長期」を「秋期新播草地のギンギン類の栄養生長期 **但し、最終採草後**」に変更。

(下線部が変更点)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数 又は 使用量	使用液量	本剤及び アシュラムを 含む農薬の 総使用回数	使用方法	適用地帯
牧草	牧野、草地	ギンギン類及び キク科の雑草	秋期経年草地の ギンギン類の 栄養生長期 但し、最終採草後	300～400 ミリリットル/10a	80～100 リットル/10a	1回	雑草茎葉散布	北海道
			春期経年草地の ギンギン類の 栄養生長期 但し、採草14日前まで	200～300 ミリリットル/10a				
			秋期新播草地の ギンギン類の 栄養生長期 但し、最終採草後	200～300 ミリリットル/10a				
			秋～春期 (9～5月) ギンギン類の 展葉時期 但し、採草14日前まで	400～600 ミリリットル/10a				
	早春～秋期 (1～11月) ギンギン類の 展葉時期	50～80倍液とし 雑草が充分ぬれ る量	1株当り25ミリ リットル 又は 1㎡当り100ミ リリットル	雑草茎葉散布 (局所処理)	—			
牧野、草地 (更新・造成)	ワラビ	ワラビ展葉期	1000～1500 ミリリットル/10a	80～100 リットル/10a	雑草茎葉散布			

＜使用上の注意事項の変更・追加＞

(無し)

石原バイオサイエンス (株)