

《石原の農薬登録情報》

(平成25年 3月13日付)

登録番号22621号

フルイニング 1 扣粒剤 (カフェンストール、カルフェントラゾンエチル、フルセトスルフロン、ベンゾビシクロン粒剤)

＜適用拡大の概要＞

使用時期の変更

①「移植水稻」の適用地帯「近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯」の適用土壌「砂壤土」および適用地帯「東北、北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯」を、「移植後7日～ノビエ4葉期 但し収穫60日前まで」に変更する。

②「移植水稻」の適用地帯「近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯」の適用土壌「壤土～埴土」を、「移植後5日～ノビエ4葉期 但し収穫60日前まで」に変更する。

③「直播水稻」を、「イネ1葉期～ノビエ3葉期 但し収穫60日前まで」に変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10アール当り 使用量	本剤の 使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道、東北) ミズガヤツリ (北海道を除く) ウリカワ クログワイ (北海道、東北を除く)	移植後7日 ～ノビエ4葉期 但し移植後30日まで	壤土～埴土	1kg	1回	湛水散布	北海道
	オモダカ (北海道を除く) ヒルムシロ セリ	移植後7日 ～ノビエ4葉期 <u>但し収穫60日前まで</u>	砂壤土～ 埴土				東北、北陸、関東・東 山・東海の普通期及 び早期栽培地帯
	オモダカ (北海道を除く) ヒルムシロ セリ	移植後5日 ～ノビエ4葉期 <u>但し収穫60日前まで</u>	壤土～埴土				近畿・中国・四国の普 通期及び早期栽培地 帯
	コウキヤガラ (関東・東山・東海、近畿・ 中国・四国、九州) シズイ(東北) アオミドロ・藻類による表 層はく離 (九州)	移植後5日 ～ノビエ4葉期 但し移植後30日まで	壤土～埴土				九州の普通期及び早 期栽培地帯
	アオミドロ・藻類による表 層はく離 (九州)	移植後7日 ～ノビエ4葉期 但し移植後30日まで	砂壤土				
	アオミドロ・藻類による表 層はく離 (九州)	移植後7日 ～ノビエ4葉期 但し移植後30日まで	砂壤土				
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	イネ1葉期～ ノビエ3葉期 <u>但し収穫60日前まで</u>	壤土～埴土				全域(北海道を除く)

各有効成分を含む農薬の総使用回数

カフェンストール: 1回、カルフェントラゾンエチル: 2回以内、フルセトスルフロン: 2回以内、ベンゾビシクロン: 2回以内

＜使用上の注意事項の追加＞

前処理剤との体系で使用する場合(東北、北陸、関東・東山・東海及び近畿・中国・四国)には、雑草の発生状況をよく観察し、時期を失しないように適期に散布すること。

石原バイオサイエンス(株)