

石原フロンサイドSC
(フルアジナム水和剤)

登録番号: 第18750号

適用拡大の概要

<適用病害虫・使用方法の変更>

- ・作物名「キャベツ」に適用病害虫名「菌核病」、使用方法「全面土壌散布」を追加する。
- ・作物名「やまのいも」に適用病害虫名「褐色腐敗病」、使用方法「全面散布土壌混和」を追加する。

<総使用回数の変更>

- ・作物名「キャベツ」のフルアジナムを含む農薬の総使用回数「2回以内(苗床では1回以内、本圃では1回以内)」を「3回以内(苗床では1回以内、本圃での土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内)」に変更する。
- ・作物名「やまのいも」のフルアジナムを含む農薬の総使用回数「4回以内」を「5回以内(植付前の土壌混和は1回以内、植付後の散布は4回以内)」に変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
やまのいも	葉渋病	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	<u>5回以内</u> (<u>植付前の土壌混和は1回以内、植付後の散布は4回以内</u>)

作物名	適用病害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
やまのいも	<u>褐色腐敗病</u>	<u>500ml/10a</u>	<u>100～200 L/10a</u>	<u>植付前</u>	<u>1回</u>	<u>全面散布土壌混和</u>	<u>5回以内</u> (<u>植付前の土壌混和は1回以内、植付後の散布は4回以内</u>)
キャベツ	苗立枯病 (リゾクニア菌) 菌核病 根こぶ病	500ml/10a	100～200 L/10a	は種又は定植前	2回以内 (苗床では1回以内、本圃では1回以内)	全面散布 土壌混和	<u>3回以内</u> (<u>苗床では1回以内、本圃での土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内</u>)
	<u>菌核病</u>			<u>定植前</u>	<u>1回</u>	<u>全面土壌散布</u>	

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>

(14)を以下のとおり変更する。

- (14) キャベツ、はくさい、レタス及び非結球レタスの全面土壌散布では、初期生育の遅延を生じることがあるが、その後回復し、作物の生育、収量に影響はない。
(定植後の多雨または、過度の灌水条件で発生しやすい)