

**アクセルフロアブル
(メタフルミゾン水和剤)**

登録番号: 第22461号

＜作物名の追加＞

- ・作物名「かんきつ」「キウイフルーツ」「かぶ」を追加する。

(**下線部**が変更点)

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数 |
|----------------|----------|------------|---------------|---------|---------|-----------|--------------------|
| <u>かんきつ</u> | ゴマダラカミキリ | 200倍 | 5～200 L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 主幹から株元に散布 | 3回以内 |
| | | 1000～2000倍 | 200～700 L/10a | | | | |
| <u>キウイフルーツ</u> | ケムシ類 | 1000倍 | 100～300 L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| <u>かぶ</u> | コナガ | | | 収穫3日前まで | | | |
| | | アオムシ | | | | | |

(該当作物にかかる部分のみ記載。)

＜使用上の注意事項の変更・追加＞

安全使用上の注意

- ・「使用後は洗眼すること。」を削除する。

以下を追加する。

- ・散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをする。