

ワンサイドP乳剤

登録番号: 第20123号

(フルアジホップP乳剤)

適用拡大の概要

<希釈水量の変更>

・作物名「えだまめ」の希釈水量「70～100L/10a」を「通常散布50～100L/10a 少量散布25～50L/10a」へ変更する。

・作物名「だいず」、「あずき」及び「いんげんまめ」の希釈水量「25～100L/10a」を「通常散布50～100L/10a 少量散布25～50L/10a」へ変更する。

<使用時期の変更>

・作物名「えだまめ」の使用時期「雑草生育期(イネ科雑草5～8葉期)但し、収穫45日前まで」及び「雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期)但し、収穫45日前まで」をそれぞれ「雑草生育期(イネ科雑草5～8葉期)但し、収穫30日前まで」及び「雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期)但し、収穫30日前まで」へ変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	フルアジホップPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
えだまめ			雑草生育期(<u>イネ科雑草5～8葉期</u>)但し、 <u>収穫30日前まで</u>	100ml/10a	<u>通常散布50～100L/10a</u> <u>少量散布25～50L/10a</u>			全域	
			雑草生育期(<u>イネ科雑草3～5葉期</u>)但し、 <u>収穫30日前まで</u>	75～100ml/10a	<u>通常散布50～100L/10a</u> <u>少量散布25～50L/10a</u>				
だいず		一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) シバムギ レッドトップ	雑草生育期(イネ科雑草8～10葉期)但し、 <u>収穫60日前まで</u>	100ml/10a	100L/10a	1回	雑草茎葉散布	全域(北海道を除く)	1回
			雑草生育期(イネ科雑草5～8葉期)但し、 <u>収穫60日前まで</u>		通常散布50～100L/10a 少量散布25～50L/10a			全域	
あずき			雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期)但し、 <u>収穫60日前まで</u>	75～100ml/10a	通常散布50～100L/10a 少量散布25～50L/10a				
いんげんまめ			雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期)但し、 <u>収穫45日前まで</u>						

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>なし