

石原フロンサイドSC
(フルアジナム水和剤)

登録番号: 第18750号

適用拡大の概要

<作物名の追加>

・作物名「ごぼう」「食用ゆり」を追加する。

<適用病害虫の追加>

・作物名「たまねぎ」に適用病害虫名「乾腐病(5分間苗根部浸漬)」を追加する。

<希釈倍数の追加>

・作物名「たまねぎ」適用病害虫名「灰色かび病」使用液量「25L/10a」に、希釈倍数「250倍」を追加する。

<総使用回数の変更>

・作物名「たまねぎ」のフルアジナムを含む農薬の総使用回数を「6回以内(苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内)」から「7回以内(全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内)」に変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
<u>ごぼう</u>	黒条病	1000倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内
<u>食用ゆり</u>	葉枯病	1000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	6回以内	散布	8回以内 (球根瞬間浸漬は2回以内、散布は6回以内)
	鱗茎さび症	50倍	-	植付前	2回以内	球根瞬間浸漬	
たまねぎ	<u>乾腐病</u>	<u>50倍</u>	<u>-</u>	<u>定植直前</u>	<u>1回</u>	<u>5分間苗根部浸漬</u>	<u>7回以内</u> (<u>全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内</u>)
	灰色腐敗病べと病	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	5回以内	散布	
	灰色かび病	<u>250～500倍</u>	25L/10a				
	白色疫病	1000倍	100～300L/10a				

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>なし