

石原フロンサイド水和剤  
(フルアジナム水和剤)

登録番号: 第17556号

適用拡大の概要

<使用回数の変更>

・作物名「食用ゆり」の使用法「球根瞬間浸漬」の本剤の使用回数を「1回」から「2回以内」へと変更する。

<総使用回数の変更>

・作物名「食用ゆり」のフルアジナムを含む農薬の総使用回数を「7回以内(球根瞬間浸漬は1回以内、散布は6回以内)」から「8回以内(球根瞬間浸漬は2回以内、散布は6回以内)」に変更する。

・作物名「たまねぎ」のフルアジナムを含む農薬の総使用回数を「6回以内(苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内)」から「7回以内(全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内)」に変更する。

(**下線部**が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
食用ゆり	葉枯病	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	6回以内	散布	<b>8回以内</b> ( <b>球根瞬間浸漬は2回以内、散布は6回以内</b> )
	鱗茎さび症	50～200倍	-	植付前	<b>2回以内</b>	球根瞬間浸漬	
たまねぎ	灰色腐敗病 べと病 灰色かび病	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	<b>7回以内</b> ( <b>全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内</b> )
	灰色かび病	500倍	25L/10a				
	白色疫病	1000倍	100～300L/10a				
	乾腐病	50倍	-	定植直前	1回	5分間 苗根部浸漬	

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>なし