

**ケンジャフロアブル
(イソフェタミド水和剤)**

登録番号: 第23993号

適用拡大の概要

<作物名の追加>

作物名「かんきつ」、「もも」、「うめ」、「おうとう」、「かき」、「いちご」、「メロン」、「トマト」、「ミニトマト」、「なす」、「キャベツ」を以下のとおり追加する。

(下線部が変更点)

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	イソフェタミドを 含む 農薬の 総使用回数
<u>かんきつ</u>	灰色かび病 黒点病 そうか病	1500倍	200～700L /10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内
<u>もも</u>	灰星病	2000倍		収穫前日 まで			
<u>うめ</u>	黒星病						
<u>おうとう</u>	灰星病						
<u>かき</u>	うどんこ病 灰色かび病 落葉病	1500倍	100～300L /10a	収穫14日前 まで			
<u>いちご</u>	灰色かび病			収穫前日 まで			
<u>メロン</u>	つる枯病 うどんこ病						
<u>トマト</u> <u>ミニトマト</u>	葉かび病 うどんこ病 灰色かび病						
<u>なす</u>	菌核病 うどんこ病 灰色かび病						
<u>キャベツ</u>	菌核病						

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>

以下を追加する。

・なすに使用する場合、果実に汚れを生じるおそれがあるので、十分に注意すること。