

稲発酵粗飼料[WCS]に使用できます。
1キロ粒剤はWCSマニュアルに掲載されました。

湛水直播の 除草場面で大活躍!

非SU系水稻用除草剤



プレキープ® 1キロ粒剤 フロアブル

湛水直播のは種前



は種時以降

は種時の
同時処理も可能!

特長

非SU系の2成分除草剤

ピラゾキシフェンとベンゾピシクロンの2種成分混合剤です。


湛水直播の「は種時」と「は種前後」

及び、移植水稻の「移植前後」に使用可能

水稻に対する安全性が高く、湛水直播栽培の「は種前」、「は種時」、「は種直後」及び、移植栽培の「移植前」、「移植直後」に使用できます。


SU抵抗性雑草に優れた効果を発揮

非SU成分の初期除草剤であり、SU抵抗性雑草のコナギ、ホタルイ、アゼナ類に対してすぐれた効果を示します。



● 使用時期の目安(直播水稻)

注) 本剤の使用回数は1回です。



※地域、作型、気象条件により、雑草の発生状況は異なりますので、使用時期を失しないように散布してください。

適用雑草と使用方法

1キロ粒剤	作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
	直播 水稲	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	は種時	は種時 湛水直播の代かき後～は種7日前 または は種直後～ノビエ1葉期 但し収穫90日前まで	1kg	1回
移植 水稲	植代後～移植7日前 または 移植直後～ノビエ1葉期 但し移植後30日まで		湛水散布 または 無人航空機による散布			

ピラゾキシフェンを含む農薬の総使用回数：2回以内、ベンゾピシクロンを含む農薬の総使用回数：3回以内

フロアブル	作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
	直播 水稲	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	は種時	は種時 湛水直播の代かき後～は種7日前 または は種直後～ノビエ1葉期 但し収穫90日前まで	300～500ml	1回
移植 水稲	植代後～移植7日前 または 移植直後～ノビエ1葉期 但し移植後30日まで		原液湛水散布 または 無人航空機による滴下			

ピラゾキシフェンを含む農薬の総使用回数：2回以内、ベンゾピシクロンを含む農薬の総使用回数：3回以内

多年生雑草の草種別散布適期

1キロ粒剤	雑草名	散布適期	
		直播水稲の場合	移植水稲の場合
1 キ ロ 粒 剤	ホタルイ	発生始期まで	発生始期まで
	ミズガヤツリ		
	ウリカワ		
	オモダカ	—	発生前～発生始期まで
	ヒルムシロ	発生期まで	発生期まで

フロアブル	雑草名	散布適期	
		直播水稲の場合	移植水稲の場合
フ ロ ア ブ ル	ホタルイ	発生始期まで	発生始期まで
	ヘラオモダカ	—	
	ミズガヤツリ	発生始期まで	
	ウリカワ	発生始期まで	発生期まで
	ヒルムシロ	発生期まで	

⚠ 使用上の注意事項

- 使用前によく振ってから使用してください。(フロアブル)
- 本剤は、後処理剤との組み合わせで使用してください。
- 少量散布(300ml/10a)は特に一発処理型除草剤との組み合わせで使用してください。(フロアブル)
- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの1葉期までに時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にブレが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。
- オモダカは発生期間が長く、生育段階によって効果にブレがあるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。(1キロ粒剤)
- 苗の植付けが均一になるように、代かきをていねいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特に

ていねいに行ってください。

- 散布に当たっては、水の出入りを止め、湛水のまま田面に均一に散布してください。散布後は、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態(3～5cm)を保ち、田面を露出させないようにしてください。
- 移植前またはは種前に使用する場合は、植代後に土が落ち着いてから散布し、7日以上の間隔をあけて稲を移植またはは種してください。
- 直播水稲のは種時に通常の湛水状態より水を落として散布する場合は、散布後速やかに通常の湛水状態(水深3～5cm)にしてください。
- 次のような条件下では薬害が発生するおそれがあるので、使用をさせていただきます。
1) 砂質土壌の水田及び漏水田(減水深2cm/日以上)
2) 軟弱な苗を移植した水田
3) 極端な浅植えの水田及び浮き苗の多い水田
- 梅雨期等、散布後に多量の降雨が予想される場合は

除草効果が低下することがあるので、使用をさせていただきます。

- 本剤はその殺草特性からいぐさの生育を阻害するおそれがあるので、いぐさの生育期に隣接田で使用する場合は、十分注意してください。
- いぐさ栽培予定田では使用しないでください。
- 散布後の水田水を他の作物に灌水しないでください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。(1キロ粒剤)
- 無人航空機による散布の注意事項は、商品ラベルを参照してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病虫害防除等関係機関の指導を受けるようにしてください。

本印刷物は、令和2年7月時点での知見に基づいて作成しています。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。

※空容器は圃場などに放置せず、適切に処理してください。