

ISK

農林水産省登録
第17224号



倒さないコメ作り。

水稻倒伏軽減剤



スマレクト® 粒剤


長稈品種に

©はシンジェンタ社登録商標

シャープな効きめが、コメ作りの仕上げに欠かせない。

■イネの背丈を低く抑えます。

スマレクトは、イネの成長をつかさどるジベレリンの生成を抑制し、散布後成長する第3節間を中心にした上位節間の伸長を抑制します。その結果、イネは倒れにくくなります。



無処理 スマレクト散布

■登熟を向上させます。

スマレクトを散布したイネは止葉が直立し、受光態勢のよい草姿となります。その結果、登熟歩合・千粒重が向上することが、多くの試験を通して確認されています。



■良食味米の安定多収に欠かせません。

悩みのタネの倒伏を効果的に軽減し、コメの品質、収量を安定させます。

■ムダなく倒伏を軽減します。

倒伏するかどうか判断できる時期(出穂前20日～7日)に使用できます。

■収穫作業の能率を高めます。

倒伏が軽減できるので、収穫作業がスムーズに、効率よく運びます。

■転作跡の復元田など強地力田でも効果を発揮します。


イネの生育が旺盛になりがちな大豆・野菜などの転作水田でも有効です。

(スマレクトの正しい使い方)

1 出穂の7～20日前に散布

都道府県の農業改良普及センターや農協などが発表する出穂予想日を参考にして、所定の適期に散布してください。

使用時期



2 散布量は2～3kg/10アール

所定の薬量で、十分に確実な効果を発揮します。

適用作物と使用方法

作物名	使用目的	使用量	使用時期	*使用回数	使用方法
水 稻	節間短縮による倒伏軽減	2～3kg/10a	出穂7～20日前	1回	湛水散布
	登熟歩合向上	3kg/10a	出穂10～20日前		無人ヘリコプターによる散布
					湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布

* 本剤およびバクトロゾールを含む農薬の総使用回数

3 散布ムラに注意

散粒ホースや散粒器などを使用して均一散布に心がけてください。(重複散布や散布ムラはそのまま効果のムラになります。)

使用上の注意

- 温度、土壌、栽培品種および連年使用など、使用する水田の条件や栽培管理によって効果の発現程度に差異を生じるので、使用量、使用方法についてはあらかじめ病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 黒ぼく土壌では効果が十分に発揮されない場合がありますので注意してください。
- 散布後少なくとも3～4日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 重複散布や多量散布は薬害を生じたり、後作物や次年度の作物に影響する場合がありますので使用量を厳守してください。
- 無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は、無人ヘリコプター散布に関するラベル注意事項を守ってください。
- 本剤を使用した後に後作物として野菜類を作付する場合、浅い耕起では初期生育に影響することがあるので、丁寧に深く耕起してから作付してください。
- 本剤を使用した水田土を野菜類の育苗用床土には使用しないでください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本印刷物は、令和2年7月時点での知見に基づいて作成しています。

