

ランマンフロアブル 登録番号: 第20624号
(シアゾファミド水和剤)

適用拡大の概要

<適用病害虫名の追加>

- ・作物名「キャベツ」の適用病害虫名に「ピシウム腐敗病」を追加する。
- ・作物名「はくさい」の適用病害虫名に「白さび病」を追加する。

<作物群の分類整理に伴う記載変更>

- ・作物名「なばな類(なばなを除く)」を削除し、作物名「非結球あぶらな科葉菜類」を「非結球あぶらな科葉菜類(なばな類を除く)」へ変更する。
- ・作物名「なばな」を「なばな類」へ変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアゾファミドを含む農薬の総使用回数
キャベツ	べと病 <u>ピシウム腐敗病</u>	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	4回以内	散布	6回以内 (育苗期の灌注は1回以内、本圃での株元灌注は1回以内、散布は4回以内)
			250mL/株	収穫14日前まで	1回	株元灌注	
	根こぶ病	500倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約2.5～7L) 当り2L	定植前日～当日	1回	灌注	
はくさい	べと病 ピシウム腐敗病 <u>白さび病</u>	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	4回以内	散布	
			250mL/株	収穫14日前まで	1回	株元灌注	
	根こぶ病	500倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約2.5～7L) 当り2L	定植前日～当日	1回	灌注	

次ページに続く

ランマンフロアブル (シアゾファミド水和剤)	登録番号: 第20624号
---	---------------

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアゾファミドを含む農薬の総使用回数
非結球あぶらな科葉菜類(<u>なばな類を除く</u>)	白さび病	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
<u>なばな類</u>	根こぶ病	500倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約2.5～7L) 当り2L	定植前日～当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、散布は3回以内)

(該当作物のみ記載。) ※「なばな類(なばな類を除く)」は記載削除

<使用上の注意事項の変更・追加> なし