

ドーシャスフロアブル
(シアゾファミド・TPN水和剤)

登録番号: 第21199号

適用拡大の概要

<総使用回数の変更>

- ・作物名「きゅうり」の、TPNを含む農薬の総使用回数を「14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内)」に変更する。
- ・作物名「トマト」の、TPNを含む農薬の総使用回数を「6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内)」に変更する。
- ・作物名「ねぎ」の、TPNを含む農薬の総使用回数を「4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)」に変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアゾファミドを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
トマト	疫病 葉かび病 輪紋病	1000倍	150～ 300L/10a	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内	6回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内)
きゅうり	べと病 うどんこ病 褐斑病 炭疽病 黒星病							14回以内(土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内)
ねぎ	べと病 黒斑病		100～ 300L/10a	収穫14日 前まで	3回以内			4回以内(土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>なし