

殺菌剤

## 石原フロンサイド水和剤



殺菌剤分類

29

農林水産省登録	第17556号
有効成分	フルアジナム（化管法1種）・・・・・・・・・・50.0%
性状	淡黄色水和性粉末45 $\mu$ m以下
人畜毒性	普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
有効年限	5年
包装	(100g $\times$ 25袋) $\times$ 4函 500g $\times$ 20袋

## 特長

- ✓ 広範の病害にすぐれた効果  
ばれいしょの疫病、粉状そうか病、あずき、いんげんまめの炭疽病、菌核病、たまねぎの灰色かび病、べと病、アスパラガスの茎枯病、ごぼうの黒条病、小麦の雪腐病、てんさい黒根病等、広範囲の病害にすぐれた効果を示します。
- ✓ 残効性・耐雨性にすぐれ、高い予防効果  
植物体内への浸透移行性はほとんどなく、治療効果は認められませんが、残効性、耐雨性にすぐれ高い予防効果があります。
- ✓ 天敵・有用生物に対する高い安全性  
ミツバチ、捕食性のダニ等の有用生物にはほとんど影響がありません。
- ✓ 耐性菌にも有効  
ばれいしょの疫病等の他剤耐性菌にも安定した効果があります。
- ✓ 植物病原菌の各種感染過程を阻害  
胞子発芽、侵入器官形成、胞子形成の各感染過程を阻害します。

適用作物と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール当り使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農業の総使用回数	
かんきつ	そうか病 灰色かび病 ミカンサビダニ	1000～2000倍	200～700ℓ	収穫30日前まで	1回	散布	1回	
	苗疫病 黒点病 ミカンハダニ	1000倍						
りんご	斑点落葉病 黒星病 輪紋病	1000～2000倍		収穫45日前まで				2回以内 (散布または落葉に散布は1回以内、土壌灌注は1回以内)
	すす点病 すす斑病 褐斑病	2000倍						
もも	灰星病 黒星病 ホモプシス腐敗病			2000倍				収穫7日前まで
なし	黒斑病 黒星病 輪紋病	1000～2000倍		収穫30日前まで				
うめ	黒星病	2000倍		発芽期まで 但し、収穫60日前まで				2回以内 (散布は1回以内、土壌灌注は1回以内)
ぶどう	晩腐病 べと病 枝膨病 灰色かび病 黒とう病			2000倍				
		黒とう病		250倍				休眠期
キウイフルーツ	灰色かび病 果実軟腐病	1000～2000倍		収穫30日前まで				
小麦	紅色雪腐病 雪腐小粒菌核病 雪腐大粒菌核病	1000倍	60～150ℓ	根雪前	2回以内	3回以内 (は種前は1回以内、は種後は2回以内)		
	雪腐小粒菌核病	250倍	25ℓ					
ばれいしょ	菌核病 疫病	1000～2000倍	100～300ℓ	収穫14日前まで	4回以内	6回以内 (種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内)		
	疫病	500倍	25ℓ					
		800倍	40ℓ					
	夏疫病	2000倍	100～300ℓ					
	そうか病	100倍	—	植付前	1回	種いも瞬間浸漬		
やまのいも	葉渋病	2000倍	100～300ℓ	収穫7日前まで	4回以内	5回以内 (植付前の土壌混和は1回以内、植付後の散布は4回以内)		
やまのいも(むかご)							4回以内	
あずき	炭疽病 灰色かび病	1000～2000倍	100～300ℓ	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内	
	菌核病 輪紋病	1000倍						
いんげんまめ	炭疽病 灰色かび病	1000～2000倍		収穫14日前まで				
	菌核病	1000倍						
べにばないんげん	灰色かび病							
ごぼう	黒条病			収穫21日前まで				
にんじん	黒葉枯病			収穫14日前まで				
	灰色腐敗病							

たまねぎ	べと病 灰色かび病	1000~2000倍		収穫7日前まで	5回以内		7回以内 (全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内)
	灰色かび病	500倍	25ℓ				
	白色疫病	1000倍	100~300ℓ				
	乾腐病	50倍	—	定植直前	1回	5分間 苗根部浸漬	
らっきょう	灰色かび病	2000倍	100~300ℓ	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内
	白色疫病	1000倍					
アスパラガス (露地栽培)	茎枯病 斑点病	1000~2000倍		収穫終了後 但し、秋期まで			
パイナップル	心腐病	1000倍	—	植付前	1回	20分間 苗浸漬	1回
食用ゆり	葉枯病	1000~2000倍	100~300ℓ	収穫14日前まで	6回以内	散布	8回以内 (球根瞬間浸漬は2回以内、散布は6回以内)
	鱗茎さび症	50~200倍	—	植付前	2回以内	球根瞬間浸漬	
てんさい	根腐病	1000~2000倍	100~300ℓ	収穫30日前まで	4回以内	株元散布	5回以内 (は種前の土壌混和及び苗床灌注は合計1回以内、株元散布及び散布は合計4回以内)
		1000倍					
	黒根病	100倍	3ℓ/m <sup>2</sup>	移植前	1回	苗床土壌灌注	
茶	炭疽病 輪斑病 網もち病 新梢枯死症 (輪斑病菌による) 灰色かび病	2000倍	200~400ℓ	摘採14日前まで	1回	散布	1回
たばこ	菌核病	1000倍	100~200ml/株	大土寄期まで		株元灌注	
チューリップ	灰色かび病 褐色斑点病	2000~4000倍	100~300ℓ	発病初期	7回以内	散布	7回以内
	球根腐敗病 皮膚病	100~200倍	—	植付前	1回	15分間 球根浸漬	
ゆり	葉枯病	2000倍	100~300ℓ	発病初期	3回以内	散布	3回以内
	鱗茎さび症	100~200倍	—	植付前	1回	球根瞬間浸漬	

作物名	適用病害虫名	10アール当り使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
ばれいしょ	粉状そうか病 塊茎褐色輪紋病	600g	100ℓ	植付前	1回	全面散布 土壌混和	6回以内 (種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内)
小麦	縞萎縮病			は種前			3回以内 (は種前は1回以内、は種後は2回以内)
チューリップ	条斑病 微斑モザイク病			植付前			7回以内

※本内容は2024年5月15日付の登録内容に基づいています。

## 効果・薬害等の注意事項

---

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は保護効果主体の薬剤であり、病原菌に感染した後の処理では効果が不十分な場合があるので注意してください。
- かんきつに使用する場合は次の事項に注意してください。
  - ・レモンには薬害を生じるので使用をさけてください。
  - ・ネーブル、ハッサク、清見等品種によっては薬害を生じる場合があるので注意してください。
  - ・病害とハダニ類の同時防除に使用する場合、かけ残しのないようにていねいに散布してください。
  - ・黒点病に対する防除は、そうか病、灰色かび病との同時防除として使用してください。なお、多発時の黒点病に対しては効果が劣ることがあるので注意してください。
- りんごの褐斑病に対しては、多発時には効果がやや不十分な場合があるので注意してください。
- なしに使用する場合、展葉期の散布は品種により葉に薬害を生じるので注意してください。特に幸水、豊水、新水等には薬害を生じやすいので発芽期から落花後30日までの間は使用をさけてください。
- ぶどうに使用する場合、使用時期を誤ると葉や果実に薬害を生じるので使用時期を厳守してください。なお、ネオマスカットは特に薬害を生じやすいので使用をさけてください。
- 本剤と他剤との混用は、薬害を生じやすいので注意してください。特に、なし、ぶどう、ももおよびうめでは十分に注意してください。なお、うめについては発芽期までの使用に留めてください。
- きゅうり、レタス等には薬害を生じるおそれがあるので、周辺にそれらの作物がある場合にはかからないように注意して散布してください。
- 全面散布土壌混和で使用する場合、所定量の薬量を均一に散布し、土壌と十分混和してください。降雨直後の処理は混和ムラの原因となるのでさけてください。
- ばれいしょ、たまねぎおよび小麦に対して少量散布で使用する場合、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

## 安全使用上の注意事項



●本剤は皮膚感作性を有するため、皮膚かぶれ等を生じることがあるので、次の点に注意してください。

- ・かぶれやすい体質の人および本剤または他剤においてかぶれた経験のある人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触はさけてください。
- ・薬液調製時および散布等の作業の際は帽子、保護メガネ、防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣、ゴム長靴などを着用するとともに保護クリームを使用してください。
- ・降雨時または樹木が濡れている場合には作業を行わないでください。
- ・剪定、施肥、摘果、除草、袋かけなどの管理作業をすませてから散布してください。
- ・散布後の入園はできる限り期間をおいてください。特に摘果、袋かけのような作業を行う果樹では少なくとも7～10日間の期間をあけてください。
- ・散布後の入園の際も、帽子、保護メガネ、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。
- ・散布等の作業後および摘果等のため散布後入園し作業した後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- ・作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- ・施設内では使用しないでください。
- ・高温、多湿時の長期間の散布および作業はさけてください。
- ・苗床で本剤を使用し、その苗を採苗、定植する場合には、必ず手袋を着用して作業を行い、直接苗に触れないよう注意してください。

●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

●粉末は眼に対して強い刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。

●本剤は皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。皮膚に付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落してください。

### 魚毒性等

水産動植物（魚類）に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼および海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はしないでください。

水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。

使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

### 保管

密封し、直射日光をさけ、食品と区別して冷涼・乾燥した所に保管してください。