


れんこんのアブラムシをしっかりと防除

ウララ[®] 粒剤

®は登録商標



すぐれた浸透移行性と残効性で
安定した効果が持続します!



れんこんに寄生したクワイクビレアブラムシ

特長

アブラムシに高い効果

れんこんの生育初期に大きな問題となるクワイクビレアブラムシに安定した効果を示します。

優れた残効性

葉内で適度な安定性を持ち、2~4週間の残効性があります。

新しい系統の殺虫剤

既存剤のいずれとも異なる新規な作用機作を持っているため、既存の殺虫剤に抵抗性を示すアブラムシにも有効です。

天敵・有用生物に対する安全性

カブリダニ類、寄生蜂などの天敵生物、訪花昆虫には、ほとんど影響がありません。


ユニークな作用

アブラムシの吸汁を阻害して防除します。アブラムシが衰弱して茎葉から脱落するまでに数日かかりますが、吸汁阻害は速効的で直ちに加害できなくなります。

高い浸透移行性

高い浸透移行性により、田面水へ薬剤を処理することでれんこんの茎葉から吸収され上位方向に浸透移行し、新葉に寄生するアブラムシにも高い効果を示します。

れんこんのアブラムシの発生時期とウララ粒剤の使用適期(例)



ウララ粒剤の上手な使い方

- アブラムシ発生初期が防除適期です。アブラムシの発生が見られたら早めに散布してください。
- 10アール当り3kgを湛水状態で散布してください。散布後は少なくとも7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 圃場にウキクサ類が発生する前に散布を心がけてください。(ウキクサが発生している場合は除去してから散布してください)

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	10アール当り 使用量	使用時期	使用方法	本剤およびフロニカミドを 含む農薬の総使用回数
れんこん	クワイクビレアブラムシ	3kg	生育期 但し、収穫14日前まで	湛水散布 無人ヘリコプター による散布	2回以内

使用上の注意事項

- 使用量に合わせて秤量し、使いきってください。
- 散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 本剤の使用に当たっては、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- 本剤を無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。
 - ・散布は散布機種種の散布基準に従って実施してください。
 - ・散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - ・事前に薬剤の物理性に合わせて散布装置のメタリング開度を調整してください。

※本内容は 2022 年 11 月時点での知見に基づいて作成しています。

- 使用前にラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届く所には置かないでください。