

アクセルフロアブル
(メタフルミゾン水和剤)

登録番号: 第22461号

適用拡大の概要

＜希釈倍数の変更＞

作物名「かんきつ (ゴマダラカミキリ)」の使用法「散布」の希釈倍数を「1000～4000倍」に変更する。

＜使用法の追加＞

作物名「はくさい」、「レタス」、「非結球レタス」及び「ねぎ」に使用法「無人航空機による散布」を追加する。

＜希釈倍数の追加＞

作物名「キャベツ」及び「ブロッコリー」の使用法「無人航空機による散布」に希釈倍数「10倍」を追加する。

＜適用病害虫名の変更＞

作物名「はくさい」及び「だいこん」の適用病害虫名「ダイコンサルハムシ」及び「カブラハバチ」を適用病害虫名「ダイコンハムシ」及び「カブラハバチ類」に変更する。

(**下線部**が変更点)

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数 |
|--------|---|-------------------|--------------|---------|---------|------------|--------------------|
| かんきつ | ゴマダラカミキリ | 200倍 | 5～200L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 主幹から株元に散布 | 3回以内 |
| | アゲハ類 ヨモギエダシャク クワノミハムシ | <u>1000～4000倍</u> | 200～700L/10a | | | 散布 | |
| キャベツ | コナガ アオムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ ウワバ類 | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| | コナガ アオムシ キスジノミハムシ | <u>10倍</u> | 2L/10a | | | 散布 | |
| ブロッコリー | ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ ウワバ類 | 1000倍 | 100～300L/10a | 2回以内 | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
| | ヨトウムシ ハスモンヨトウ コナガ | 1000倍 | 1.6L/10a | | | 散布 | |
| ブロッコリー | コナガ | 8倍 | 1.6L/10a | 2回以内 | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
| | ヨトウムシ ハスモンヨトウ | <u>10倍</u> | 2L/10a | | | 散布 | |
| ブロッコリー | コナガ | 1000倍 | 100～300L/10a | 2回以内 | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 |
| | ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 1000～2000倍 | 100～300L/10a | | | 散布 | |

次ページに続く

| | |
|---|---------------|
| アクセルフロアブル (メタフルミゾン水和剤) | 登録番号: 第22461号 |
|---|---------------|

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数 |
|------------|--|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| はくさい | コナガ アオムシ キスジノミハムシ ダイコンハムシ | 8倍 | 1.6L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| | ヨトウムシ ハスモンヨトウ カブラハバチ類 | 10倍 | 2L/10a | | | | |
| | コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ ダイコンハムシ | 1000倍 | 100～ 300L/10a | | | 散布 | |
| | ヨトウムシ ハスモンヨトウ カブラハバチ類 | 1000～ 2000倍 | | | | | |
| レタス | ハスモンヨトウ オオタバコガ | 8倍 | 1.6L/10a | | 無人航空機による散布 | | |
| | | 10倍 | 2L/10a | | | | |
| | | 1000～ 2000倍 | 100～ 300L/10a | | | 散布 | |
| 非結球 レタス | | 8倍 | 1.6L/10a | 無人航空機による散布 | | | |
| | | 10倍 | 2L/10a | | | | |
| | | 1000～ 2000倍 | 100～ 300L/10a | 散布 | | | |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 8倍 | 1.6L/10a | 2回以内 | 無人航空機による散布 | | |
| | | 10倍 | 2L/10a | | | | |
| だいこん | キスジノミハムシ ダイコンハムシ | 1000倍 | 100～ 300L/10a | 収穫7日前 まで | 散布 | | |
| | ハイマダラノメイガ ヨトウムシ カブラハバチ類 | 1000～ 2000倍 | | | | | |

(該当作物にかかる部分のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>なし。