

**パレード20フロアブル**  
(ピラジフルミド水和剤)

登録番号: 第24071号

適用拡大の概要

＜希釈倍数の変更＞

作物名「きゅうり」(つる枯病)の希釈倍数を「2000～4000倍」に変更する。

＜希釈倍数の追加＞

作物名「キャベツ」及び「ブロッコリー」(無人航空機による散布)の希釈倍数に「20倍」(2.0 L/10a)を追加する。

＜使用方法の追加＞

作物名「はくさい」、「レタス」及び「非結球レタス」の使用方法に「無人航空機による散布」を追加する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数					
きゅうり	灰色かび病 菌核病 うどんこ病 褐斑病 <u>つる枯病</u>	<u>2000～ 4000倍</u>	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内					
	黒斑病 白斑病 菌核病											
はくさい	菌核病	16倍	1.6L/10a	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	3回以内 (灌注は 1回以内)					
		20倍	2.0L/10a									
		32倍	3.2L/10a									
キャベツ	苗立枯病 (リゾクニア菌) 菌核病	100倍	セル成型育苗ト レイ1箱また は、ペーパーポッ ト1冊(約30× 60cm、使用土 壌約1.5～4L) 当り0.5L	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	3回以内 (灌注は 1回以内)					
	菌核病 苗立枯病 (リゾクニア菌) 根朽病											
	菌核病 株腐病 根朽病							2000～ 4000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布
	菌核病							16倍	1.6L/10a			
	<u>20倍</u>	2.0L/10a	無人航空機 による散布									
	32倍	3.2L/10a										

次ページに続く

パレード20フロアブル  
(ピラジフルミド水和剤)

登録番号: 第24071号

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数		
ブロッコリー	菌核病 黒すす病	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
		16倍	1.6L/10a			無人航空機による散布			
		<b>20倍</b>	2.0L/10a						
		32倍	3.2L/10a						
レタス 非結球レタス	菌核病 すそ枯病	100倍	セル成型育苗トレイ 1箱または、 ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L) 当り0.5L	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	3回以内 (灌注は1回以内)		
	菌核病 灰色かび病 すそ枯病	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布			
						16倍		1.6L/10a	<b>無人航空機による散布</b>
						20倍		2.0L/10a	
						32倍		3.2L/10a	

(該当作物のみ記載。)

＜使用上の注意事項の変更・追加＞ なし