

殺虫剤

石原アタブロンSC



殺虫剤分類

15

農林水産省登録	第18138号
有効成分	クロルフルアズロン 10.0%
性状	類白色水和性粘稠懸濁液体
人畜毒性	普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）
有効年限	4年
包装	250mL × 40本 335mL × 20本 500mL × 20本

特長

✓ キチン生合成阻害剤です

昆虫の表皮に含まれるキチンの生合成を阻害し、脱皮・変態に異常をきたし、やがて死亡させる、脱皮阻害作用のある殺虫剤です。（IGR剤）

✓ 遅効性です

幼虫の脱皮を阻害する薬剤ですので、効果発現は遅効的です。

✓ ハマキムシ類、ケムシ類の同時防除ができます

✓ 低濃度で残効性にすぐれています

本剤の有効成分は光、温度に対して比較的安定で、残効性にすぐれることから、散布後長期間にわたって残効が期待できます。

✓ 植物体への浸透移行性はありません

植物体内への浸透または移行性は、ほとんどありません。

✓ 天敵、有用生物に対する高い安全性

ミツバチ、マメコバチ、捕食性ダニ等の有用生物および天敵に影響がほとんどなく、IPM（総合的病害虫防除）に適した薬剤です。かきでは、難防除害虫フジコナカイガラムシに対し、土着天敵（寄生蜂）を活用した防除体系に組み込むことができます。

適用作物と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフルアズ ロンを含む農薬 の総使用回数
りんご	ハマキムシ類 ケムシ類	3000～4000倍	200～700ℓ	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内
	ヨモギエダシャク	4000～8000倍					
なし	ハマキムシ類	3000倍		収穫21日前まで			
もも		4000倍		収穫7日前まで			
かき	ハマキムシ類 カキノヘタムシ ガ カキクダアザミ ウマ	4000倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
おうとう	ハマキムシ類	4000倍		収穫7日前まで	2回以内		2回以内
ぶどう	ハスモンヨトウ			発生初期	4回以内		4回以内
樹木類	ケムシ類	4000～6000倍					

※本内容は2017年8月30日付の登録内容に基づいています。

効果・薬害等の注意事項

- 散布液調製時には、使用直前に容器をよく振とうしてください。
- 本剤は植物体上での移行性がないため、茎葉部表裏に対し均一に散布してください。
- 本剤は幼虫の脱皮を阻害してやがて死亡させる性質をもつ薬剤で、通常、死亡するまでに7～10日以上を要するので、幼虫期になるべく早く散布してください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

安全使用上の注意事項



- 街路、公園等で使用する場合は、散布中および散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬液が飛散し、桑に付着するおそれがある場所では使用しないでください。

魚毒性等

水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管

密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して冷涼な所に保管してください。