

殺菌剤

プロパティフロアブル



殺菌剤分類

50

農林水産省登録	第23368号
有効成分	ピリオフェノン（化管法2種）・・・26.8%（w/w） [30.0%（w/v）]
その他化管法該当成分	ポリ（オキシエチレン）=アルキルエーテル（1種）1.3%
性状	類白色水溶性粘稠懸濁液体
人畜毒性	普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
有効年限	3年
包装	（100ml×10本）×2箱

特長

- ✓ うどんこ病菌の様々なステージに作用
付着器、吸器、胞子の形成、菌糸の伸長に作用し、うどんこ病菌の生育に関わる様々なステージにおいて阻害効果を発揮します。
- ✓ サニテーション効果（次世代菌密度低減効果）により、病害の拡大を抑える
うどんこ病の胞子形成を強く阻害し、胞子飛散による病害の拡大を防ぐことで、次世代の菌密度を効率的に抑えます。

- ✓ 各種うどんこ病菌にすぐれた効果
既存の薬剤とは異なる新しい作用機構を持ち、きゅうり、なすなどの表皮寄生性のうどんこ病はもとより、防除が困難な内部寄生性のうどんこ病にも高い効果を示します。
- ✓ マルチスプレッド効果で作物をしっかり守る
成分が速やかに葉内で拡散し、吸器形成を強く阻害することで病斑の拡大を抑え、安定した防除効果を発揮します。

適用作物と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	10アール当り使用 液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリオフェノンを含 む農薬の総使用 回数
小麦	うどんこ病	3000~4000倍	60~150ℓ	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
りんご			200~700ℓ		2回以内		2回以内
日本なし かき		3000倍	100~300ℓ	収穫前日まで	3回以内		3回以内
ぶどう							
きゅうり いちご すいか メロン		3000倍	100~300ℓ	収穫前日まで	3回以内		3回以内
なす ピーマン さやえんどう ししとう							
かぼちゃ トマト ミニトマト		3000倍			2回以内		2回以内

※本内容は2022年2月25日付の登録内容に基づいています。

効果・薬害等の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用直前に容器をよく振ってください。
- 出来るだけ発病前または発病初期に散布してください。
- 使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

安全使用上の注意事項

- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

魚毒性等

この登録に係る使用方法では問題ありません。

保管

密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して冷涼な所に保管してください。