

畑作等除草剤

## ワンホープエースOD



除草剤分類 27,2

農林水産省登録	第24040号
有効成分	トルピラレート・・・・・・・・・・3.1% ニコスルフロン・・・・・・・・・・3.1%
性状	類白色水和性粘稠懸濁液体
人畜毒性	普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
危険物	第4類第4石油類
有効年限	3年
包装	500mL×20本 5L×3本

## 特長

✓ 北海道限定の飼料用とうもろこし専用除草剤です。

✓ シバムギ、レッドトップなどの多年生イネ科雑草に除草効果を示します。

✓ 飼料用とうもろこしの生育期に使用可能な茎葉処理剤です。

✓ 幅広い雑草に対し除草効果を発揮します。

✓ イチビ、イヌホオズキ等の問題雑草にも有効です。

## 適用作物と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		本剤の使用回数	使用方法
			薬量	希釈水量		
飼料用とうもろこし	一年生雑草及び多年生イネ科雑草	とうもろこし3～5葉期 但し、収穫45日前まで	100～200ml	100ℓ	1回	雑草茎葉散布又は全面散布

【各有効成分を含む農薬の総使用回数】

トルピラレート・・・1回、ニコスルフロン・・・1回

※本内容は2019年1月16日付の登録内容に基づいています。

## 効果・薬害等の注意事項

---

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用の直前に、容器をよく振ってください。
- 本剤は飼料用とうもろこし用除草剤のため、食用とうもろこしには使用しないでください。
- 有機リン系殺虫剤との混用および7日以内の近接散布は、薬害を生じることがあるのでさけてください。
- 散布後、一時的にクロロシス症状を生じることがありますが、その後の生育、収量に影響はありません。
- 散布薬液の飛散によって有用植物に薬害が生じることのないよう十分に注意して散布してください。
- 通常の輪作体系では後作に影響ありませんが、本剤処理後短期間内に飼料用とうもろこし以外の作物の種はさけてください。
- 雑草生育期に有効ですが、雑草が大きくなりすぎると効果が劣ることがあるので、時期を失しないように散布してください。
- 雑草茎葉にかかるよう、まきむらのないよう均一に散布してください。
- 散布後の降雨は効果を低下させるので、天候に注意してください。
- 使用后、タンク、ホース、ブーム、ノズル内に薬液が残らないよう散布器具は十分に洗浄し、他の用途に使用する場合、薬害の原因にならないよう注意してください。
- 散布器具、容器の洗浄水等は河川に流さず、周囲に影響のない方法で処理を行い、空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

## 安全使用上の注意事項

---

- 皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 危険物第四類第四石油類に属するので、火気には十分注意してください。

### 魚毒性等

この登録に係る使用方法では問題ありません。

### 保管

密栓し、火気や直射日光をさけ、食品と区別して冷涼な所に保管してください。

## 備考

---

本剤は北海道限定で販売しています。

※ワンホープ乳剤とは異なる製品ですのでご注意ください。