



# いろいろな虫をすばやく防除



カメムシ類



ハダニ類



ハマキムシ類



シンクイムシ類



アブラムシ類



チャノキイロ  
アザミウマ



オンシツ  
コナジラミ

果樹・野菜・茶の害虫を同時防除!!

# テリスター<sup>®</sup> 水和剤

農林水産省登録 第20791号

FMC、FMCロゴ、®を付した商標は、FMC Corporationまたはその米国およびその他の国の子会社・関連会社の登録商標です。

# カメムシ、ハダニ、アブラムシ等、広範な害虫に

# テムスター® 水和剤

成分:ピフェントリン…2.0% 毒性:普通毒(毒劇物に該当しないものを指している通称)

## ★特長★

### 幅広い殺虫スペクトラム

適用作物幅が広く、カメムシ目害虫やアザミウマ類など多くの害虫にすぐれた効果があります。

### 速効的な殺虫効果

速効性にすぐれ、散布直後から強い殺虫効果を示します。また、効果の持続性が長く、少ない散布回数で高い防除効果が得られます。

### ハダニ類にも有効

ハダニ類にも高い活性を示し、リサーチェンス(異常増殖)が起こりにくいピレスロイド剤です。

## ⚠️ 使用上の注意事項

- てんさいに対して希釈倍数250倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用してください。
- ばら、さく、カーネーションに使用する場合、収穫間際の散布は葉や花に汚れを生じる場合があるのでさけてください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 取扱いに十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の担当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の担当を受けてください。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の担当を受けてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着するおそれのある場所では使用をさけてください。本剤の散布の際に着用していた衣服は養蚕作業に用いるものと区別してください。
- ミツバチ・マルハナバチに対して影響があるので、十分注意してください。
- 水産動植物(魚類・甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意してください。



## ★適用害虫と使用方法★

\*印は本剤およびピフェントリンを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	10a当り使用液量	使用時期	本剤の使用回数*	総使用回数*				
かんきつ	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ カメムシ類	1,000~2,000	200~700ℓ	収穫前日まで	3回以内	3回以内				
	アブラムシ類 ワタミヒゲナガゾウムシ									
りんご	モモシクイガ キンモンホソガ ギンモンハモグリガ ハマキムシ類 アブラムシ類 リンゴハダニ ナミハダニ	1,000						1回	1回	
	シンクイムシ類 ハマキムシ類 ナシチビガ アブラムシ類 ハダニ類	1,000~2,000						2回以内	2回以内	
なし	カメムシ類	1,000~2,000						2回以内	2回以内	
もも	モモハモグリガ アブラムシ類 カメムシ類	1,000						1回	2回以内 (散布:1回以内、 くんぼ:1回以内)	
ぶどう	チャノキイロアザミウマ	1,000~2,000						2回以内	2回以内	
かき	カメムシ類 チャノキイロアザミウマ	1,000~2,000						2回以内	2回以内	
	カキクダアザミウマ ハダニ類 カキノヒメヨコバイ	1,000						2回以内	2回以内	
びわ	アブラムシ類 オオタバコガ カメムシ類	1,000~2,000						2回以内	2回以内	
あけび(果実)		1,000		1回	1回					
ハスカップ	アブラムシ類	1,000~1,500	100~300ℓ	収穫21日前まで	4回以内	4回以内				
ばれいしょ		1,500		収穫3日前まで	4回以内	4回以内				
あずき	アズキノメイガ	1,500		収穫7日前まで	2回以内	2回以内				
きゅうり	アブラムシ類 オンシツコナジラミ			3回以内	3回以内					
すいか	アブラムシ類 ハダニ類			4回以内	4回以内					
メロン	アブラムシ類 ハダニ類	1,000	150~300ℓ	収穫前日まで	4回以内	4回以内				
	タバココナジラミ類 (シルバーリープコナジラミを含む)									
なす	アブラムシ類 オンシツコナジラミ ハダニ類							3回以内	3回以内	
	コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ類	1,000~1,500						4回以内	4回以内	
キャベツ はくさい		1,000						2回以内	2回以内	
ねぎ	シロイチモジトウ	1,000						2回以内	2回以内	
だいごん	アブラムシ類	1,000~1,500						2回以内	2回以内	
てんさい	ヨトウムシ	250					25ℓ	収穫7日前まで	4回以内	4回以内
		1,000~1,500								
	カメノコハムシ	1,500								
だいず	アブラムシ類		100~300ℓ	収穫3日前まで	3回以内	3回以内				
	ハダニ類									
いんげんまめ	アブラムシ類 インゲンマメゾウムシ									
パセリ	アブラムシ類									
茶	チャノコカクモンハマキ チャハマキ チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ カンザワハダニ ヨモギエダシヤク	1,000	200~400ℓ	摘採14日前まで	2回以内	2回以内				
	アズキノメイガ ハダニ類、アサトビハムシ		200~700ℓ	収穫30日前まで						
たばこ	ヨトウムシ アブラムシ類 オンシツコナジラミ	1,500	25~180ℓ	収穫10日前まで						
芝	スジキリヨトウ シバツトガ		300mℓ	発生初期	3回以内	3回以内				
ばら・さく カーネーション	ハダニ類	1,000	150~300ℓ	-	3回以内	3回以内				
	ケムシ類		200~700ℓ	発生初期	6回以内	6回以内				

使用方法: 散布

\*本印刷物は2023年3月時点での知見に基づいて作成しています。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

ISK 石原バイオサイエンス株式会社

〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目10番2号

ホームページ アドレス <https://ibj.iskweb.co.jp>

ホームページの  
製品情報へ



取り扱い