

グリーンアージラン液剤
(アシュラム液剤)

登録番号: 第22788号

【適用拡大の概要】

<適用雑草名の変更>

・作物名「日本芝」の適用雑草名「畑地一年生雑草」を「一年生雑草」に変更する。

<適用雑草名の追加>

・作物名「日本芝」の適用雑草名に「多年生イネ科雑草」を追加する。

(**下線部**が変更点)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	アシュラムを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
日本芝	—	一年生雑草	秋～春期 (芝発芽前)	1000～1250 ml/10a	200～300 L/10a	3回以内	散布 (茎葉兼 土壌処理)	3回以内
			芝生育期 (雑草生育初期)	400～600 ml/10a				
		多年生 イネ科雑草	春夏期 芝生育期 (雑草生育期)	800～1000 ml/10a				

(該当作物のみ記載)

<使用上の注意事項の変更・追加>

日本芝に使用する場合の注意事項を変更し、以下のとおりとする。

・日本芝に使用する場合は、下記の項目に注意すること。

- ①芝生育期(雑草発生初期)に使用する場合、芽立ち期の散布は一時的に黄化を生じるおそれがあるのでさけること。
- ②芝生育期(雑草発生初期)及び春夏期芝生育期(雑草生育期)に使用する場合、夏季高温時の散布は一時的に黄化を生じるおそれがあるので、あらかじめ薬害の確認をしたうえで使用すること。
- ③メヒシバ、スズメノカタビラには効果を安定させるため、4～5葉期までに使用すること。
- ④春夏期芝生育期(雑草生育期)に使用する場合、多年生イネ科雑草草丈20cm 以内で使用すること。