

パレード20フロアブル
(ピラジフルミド水和剤)

登録番号: 第24071号

【適用拡大の概要】

＜作物名の追加＞

・作物名「にんじん」「にら」「ズッキーニ」「ししとう」「アスパラガス」「にんにく」「はなやさい類(ブロッコリーを除く)」を追加する。

＜使用方法の追加＞

・作物名「ブロッコリー」に使用方法「灌注」を追加する。

＜総使用回数の変更＞

・作物名「ブロッコリー」のピラジフルミドを含む農薬の総使用回数を「3回以内(灌注は1回以内)」に変更する。

＜作物名の変更＞

・作物名「あずき」及び「いんげんまめ」を「豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)」に変更する。

＜作物名及び適用病害虫名の変更＞

・作物名「すいか」「メロン」を「うり類(成熟)」、適用病害虫名「つる枯病」「菌核病」を「つる枯病(すいか、メロン)」「菌核病(すいか、メロン)」に変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
<u>にんじん</u>	黒葉枯病	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
<u>にら</u>	白斑葉枯病						
<u>ズッキーニ</u>	うどんこ病						
<u>ししとう</u>	うどんこ病 黒枯病						
<u>アスパラガス</u>	茎枯病	2000倍	100～700L/10a				
<u>にんにく</u>	黒腐菌核病	原液	種球重量の1%	植付前	1回	種球塗沫	3回以内 (種球塗沫は1回以内、 散布は2回以内)
	葉枯病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	
<u>はなやさい類 (ブロッコリーを除く)</u>	黒すす病	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内		灌注
	菌核病	100倍	セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り0.5L	育苗期後半～定植当日	1回		

次ページに続く

パレード20フロアブル
(ピラジフルミド水和剤)

登録番号: 第24071号

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数	
ブロッコリー	菌核病 黒すす病	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内 (灌注は1回以内)	
		16倍	1.6L/10a			無人航空機による散布		
		32倍	3.2L/10a					
	菌核病	100倍	セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L) 当り0.5L	育苗期後半～定植当日	1回	灌注		
豆類 (種実、ただし、 らっかせいを除く)	菌核病 灰色かび病	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布		3回以内
うり類(成熟)	うどんこ病 つる枯病 (すいか、メロン) 菌核病 (すいか、メロン)							

(該当作物のみ記載。)

＜使用上の注意事項の変更・追加＞ 以下を追加する。

・にんにくの種球に塗沫する場合は、薬剤が種球に均一に付着するよう処理した後、乾燥させること。