








Driven by **CYCLAPRYN**®

害虫防除のテッパン技

-  **幅広い殺虫スペクトラムで重要害虫の同時防除が可能**
チョウ目、ハエ目、カメムシ目、アザミウマ目および甲虫目などの広範囲の害虫に効果を示します。特にチョウ目害虫には高い効果を示します。
-  **害虫の幅広いステージで安定した効果を発揮**
幼虫の発育ステージや温度に関わらず高い効果を示します。また、成虫に対する殺虫活性や産卵抑制効果をあわせ持っています。
-  **速やかな食害抑制効果**
主に食毒により作用しますが、経皮的にも薬剤が取り込まれ、速やかに中毒症状を示し、摂食行動を停止させます。
-  **優れた耐雨・残効性**
散布後、長期にわたって安定した効果を示し、耐雨性にも優れています。
-  **作物に対する高い安全性**



チョウ目



アザミウマ目



ハエ目



カメムシ目




農林水産省登録 第24023号
 人畜毒性: 普通物 (毒劇物に該当しないものを指している通称)
 有効成分: シクラニプロロール4.5% (w/w)

適用害虫と使用方法 (果樹抜粋) *印は本剤およびシクラニプロロールを含む農薬の総使用回数

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
かんきつ	アゲハ類、アザミウマ類、ミカンハモグリガ コアオハナムグリ、ケシキスイ類、ケムシ類 ミカンバエ成虫、ゴマダラカミキリ、ハマキムシ類 クワノミハムシ	2,000倍	200~700ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布
りんご	シンクイムシ類、ハマキムシ類、ケムシ類 コガネムシ類、カメムシ類、キンモンホソガ ギンモンハモグリガ、ヒメボクトウ、オオタバコガ					
なし	シンクイムシ類、ハマキムシ類、カメムシ類 ヒメボクトウ、チュウゴクナシキジラミ					
もも	シンクイムシ類、ハマキムシ類、コガネムシ類 カメムシ類、モモハモグリガ コスカシバ、クビアカツヤカミキリ					
ネクタリン	ケムシ類					
小粒核果類	ケムシ類、ハマキムシ類、シンクイムシ類 クビアカツヤカミキリ、モモヒメヨコバイ					
おうとう	ハマキムシ類、カメムシ類 オウトウショウジョウバエ、マメコガネ コスカシバ、クビアカツヤカミキリ					
ぶどう	ケムシ類、コガネムシ類、カメムシ類 チャノキイロアザミウマ、クビアカスカシバ ハマキムシ類					
かき	カキノヘタムシガ、イラガ類、カメムシ類 ヒメコスカシバ、ハマキムシ類、アザミウマ類 ハスモンヨトウ					

※小粒核果類に含まれる作物…あんず、うめ、すもも

ハマキムシ類に対する残効性 (りんご)



石原産業株式会社 中央研究所 (2016年)



試験場所: 石原産業(株)中央研究所温室
 品 種: ふじ
 供 試 虫: リンゴコカクモンハマキ 4 齢幼虫
 試験方法: ポット植えりんご樹に充分量茎葉散布処理し、処理後経時的に展開葉の枝を切り取り、幼虫接種。接種7日後に生存虫数を調査。

効果・薬害等の注意事項

- ・使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。
- ・発生初期に散布むらのないように散布してください。
- ・使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせ調節してください。
- ・過度の連用をさけ、作用性の異なる薬剤と輪番使用してください(抵抗性発達回避)。
- ・カメムシ類防除に使用する場合は、多発時には効果が劣ることがあるので注意してください。

- ・適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
- ・使用方法等を厳守してください。特に初めて使用する場合は病害虫防除等関係機関の指導を受けるようにしてください。

安全使用上の注意事項

- ・眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください(刺激性)。使用後は洗眼してください。
- ・ミツバチに対する注意
 - ① ミツバチの巣箱およびその周辺にかけないようにしてください。
 - ② ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ③ 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

- ・蜜に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ・自動車、壁などの塗装面にかからないようにしてください(塗装汚染・変色)
- ・危険物第四類第三石油類に属するので、火気には十分注意してください。

保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、涼涼な所に保管してください。

ラベルを守って正しく使いましょう!
 適用作物、薬量(希釈倍数)、
 使用時期、使用回数を守りましょう
 石原は「食の安全」を大切にします

- 使用前にラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

本印刷物は2023年8月時点での知見に基づいて作成しています。

ISK 石原バイオサイエンス株式会社
 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目10番2号
 ホームページ アドレス <https://ibj.iskweb.co.jp>



取り扱い