

パレード20フロアブル
(ピラジフルミド水和剤)

登録番号: 第24071号

【適用拡大の概要】

適用拡大の概要

＜適用病害虫名の追加＞

- ・作物名「トマト」「ミニトマト」に適用病害虫名「斑点病」を追加する。
- ・作物名「にら」に適用病害虫名「白絹病」を追加する。
- ・作物名「ねぎ」に適用病害虫名「小菌核病」を追加する。
- ・作物名「はなやさい類」に適用病害虫名「黒すす病」を追加する。
- ・作物名「きく」に適用病害虫名「褐斑病」を追加する。

＜作物名の追加＞

- ・作物名「ゆり」を追加する。

＜作物名の変更＞

- ・作物名「花き類・観葉植物(ばら、きく、りんどう、トルコギキョウを除く)」を作物名「花き類・観葉植物(ばら、きく、りんどう、ゆり、トルコギキョウを除く)」へ変更する。

＜使用方法の追加＞

- ・作物名「たまねぎ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
トマト、ミニトマト	灰色かび病 葉かび病 うどんこ病 菌核病 <u>斑点病</u>	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	すすかび病	2000倍					
にら	白斑葉枯病	2000～4000倍	セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り0.5L	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	3回以内(灌注は1回以内)
	<u>白絹病</u>	2000倍					
ねぎ	黒腐菌核病	100倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内(灌注は1回以内)
	黒斑病 葉枯病 小菌核腐敗病 <u>小菌核病</u>	2000～4000倍					
	さび病 黒腐菌核病 白絹病	2000倍					

次ページに続く

パレード20フロアブル
(ピラジフルミド水和剤)

登録番号: 第24071号

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
はなやさい類	菌核病 黒すす病	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内 (灌注は1回以内)
		16倍	1.6L/10a			無人航空機による散布	
		20倍	2.0L/10a				
		32倍	3.2L/10a				
菌核病	100倍	セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り0.5L	育苗期後半～定植当日	1回	灌注		
			定植前日～定植当日				
きく	白さび病	2000～4000倍	100～300L/10a	発病初期	3回以内	散布	3回以内
	うどんこ病	4000倍					
	<u>褐斑病</u>	2000倍					
<u>ゆり</u>	葉枯病	2000倍	100～300L/10a	発病初期	3回以内	散布	3回以内
<u>花き類・観葉植物(ばら、きく、りんどう、ゆり、トルコギキョウを除く)</u>	うどんこ病	4000倍					
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
		20倍	1.6L/10a			<u>無人航空機による散布</u>	
	25倍	2.0L/10a					
	40倍	3.2L/10a					

(該当作物のみ記載。)

＜使用上の注意事項の変更・追加＞

農薬登録申請書第9項(1)を以下のとおり変更する。

(1) 使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。