

パレード20フロアブル
(ピラジフルミド水和剤)

登録番号: 第24071号

【適用拡大の概要】

適用拡大の概要

＜適用病害虫名の追加＞

- ・作物名「さやえんどう」に適用病害虫名「うどんこ病」を追加する。
- ・作物名「たまねぎ」に適用病害虫名「黒腐菌核病」を追加する。
- ・作物名「アスパラガス」に適用病害虫名「斑点病」を追加する。

＜使用方法の追加＞

- ・作物名「うり類(成熟)」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「ねぎ」に使用方法「5～10分間苗根部浸漬」を追加する。

＜総使用回数の変更＞

- ・作物名「ねぎ」のピラジフルミドを含む農薬の総使用回数を「3回以内(灌注及び浸漬は合計1回以内)」に変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
さやえんどう	菌核病 灰色かび病 褐紋病 <u>うどんこ病</u>	2000～ 4000倍	100～300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 <u>黒腐菌核病</u>	2000～ 4000倍	100～300L/10a				
	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	20倍	1.6L/10a				
		25倍	2.0L/11a				
		40倍	3.2L/10a				
アスパラガス	茎枯病 <u>斑点病</u>	2000倍 2000倍	100～700L/10a				
	うり類 (成熟)	うどんこ病 つる枯病 (すいか、メロン) 菌核病 (すいか、メロン)	2000～ 4000倍			100～300L/10a	
うどんこ病		16倍	1.6L/10a			<u>無人航空機 による散布</u>	
		20倍	2.0L/11a				
		32倍	3.2L/10a				

次ページに続く

パレード20フロアブル
(ピラジフルミド水和剤)

登録番号: 第24071号

(**下線部**が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む農薬の総使用回数
ねぎ	黒腐菌核病	100倍	セル成型育苗トレイ1箱または、ペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L) 当り0.5L	育苗期後半～定植当日	1回	灌注	3回以内 (灌注及び浸漬は合計1回以内)
	黒腐菌核病	25～50倍	-	定植直前		5～10分間 苗根部浸漬	
	黒斑病 葉枯病 小菌核腐敗病 小菌核病	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	
	さび病 黒腐菌核病 白絹病	2000倍					

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>なし