

**石原フロンサイドSC
(フルアジナム水和剤)**

登録番号: 第18750号

適用拡大の概要

<薬量の追加>

・作物名「ばれいしょ」適用病害虫名「粉状そうか病」に、薬量「400ml/10a」を追加する。

<適用病害虫名・使用方法の追加>

・作物名「ばれいしょ」適用病害虫名「粉状そうか病」に、使用方法「植溝散布」を追加する。

・作物名「ばれいしょ」に、適用病害虫名「そうか病」、使用方法「植溝散布」を追加する。

<総使用回数の変更>

・作物名「ばれいしょ」のフルアジナムを含む農薬の総使用回数を「6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和は1回以内、散布は4回以内)」から「6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内)」へ変更する。

<適用病害虫名の追加>

・作物名「小麦」に適用病害虫名「縞萎縮病」を追加する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	疫病	500倍	25L/10a	収穫 7日前 まで	4回 以内	散布	6回以内 (種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内)
		1000～2000倍	100～ 300L/10a				
	菌核病	1000倍					
	夏疫病	2000倍					
	そうか病	100倍	-	植付前	1回	種いも瞬間浸漬	

作物名	適用病害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
ばれいしょ	粉状そうか病	400～600ml /10a	100～200 L/10a	植付前	1回	全面散布 土壌混和	6回以内 (種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内)
	粉状そうか病 そうか病	200ml/10a	20L/10a	植付時		植溝散布	
小麦	縞萎縮病	600ml/10a	100L/10a	は種前	1回	全面散布 土壌混和	3回以内 (は種前は1回以内、は種後は2回以内)

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>なし