

ケンジャフロアブル
(イソフェタミド水和剤)

登録番号: 第23993号

適用拡大の概要

<作物名の変更、追加>

- ・作物名「豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)」を「豆類(種実、ただし、いんげんまめ、らっかせいを除く)」に変更し、作物名「いんげんまめ(菌核病、灰色かび病、炭疽病)」を追加する。

<適用病害虫の追加>

- ・作物名「ぶどう」に、適用病害虫名「褐斑病」および「うどんこ病」を追加する。
- ・作物名「きゅうり」に、適用病害虫名「褐斑病」および「うどんこ病」を追加する。
- ・作物名「レタス・非結球レタス」に、適用病害虫名「灰色かび病」を追加する。

(下線部が変更点)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イソフェタミドを含む農薬の総使用回数	
ぶどう	黒とう病 灰色かび病 <u>褐斑病</u> <u>うどんこ病</u>	1500倍	200～ 700L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内	
<u>豆類(種実、ただし、 いんげんまめ、らっ かせいを除く)</u>	菌核病 灰色かび病 <u>炭疽病</u>	1500倍	100～ 300L/10a	収穫14日前 まで	2回以内		散布	2回以内
<u>いんげんまめ</u>								
きゅうり	菌核病 灰色かび病	1000～ 1500倍		収穫前日 まで	4回以内			4回以内
	<u>褐斑病</u> <u>うどんこ病</u>	1500倍						
レタス 非結球レタス	菌核病 <u>灰色かび病</u>	1500倍		収穫14日前 まで	3回以内	3回以内		

(該当作物のみ記載。)

<使用上の注意事項の変更・追加>なし