

**トビキリジャンボ** 登録番号: 第21465号  
**(カフェンストール・ダイムロン・ピラゾキシフェン・ベンゾビシクロン粒剤)**

適用拡大の概要

＜適用土壌、適用地帯の削除＞

・適用土壌、適用地域欄を削除する。

＜適用雑草名の変更＞

- ・作物名「移植水稻」の適用雑草名から適用地域の記載を削除する。
- ・作物名「移植水稻」の適用雑草名「水田一年生雑草」を「一年生雑草」に変更する。

＜使用時期の変更＞

・作物名「移植水稻」の使用時期を「移植後3日～ノビエ2.5葉期但し、移植後30日まで」に変更する。

＜総使用回数の変更＞

・作物名「移植水稻」の「ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数」を「2回以内」から「3回以内」に変更する。

(下線部が変更点)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	<u>一年生雑草</u> 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ <u>ミズガヤツリ</u> <u>ヘラオモダカ</u> ヒルムシロ <u>セリ</u> <u>エゾノサヤヌカグサ</u> <u>サ</u> <u>シズイ</u> <u>コウキヤガラ</u> <u>アオミドロ・藻類</u> <u>による表層はく離</u>	<u>移植後3日～</u> <u>ノビエ2.5葉期</u> <u>但し、移植後30日</u> <u>まで</u>	小包装(パック) 10個(500g) /10a	1回	水田に小包装 (パック)のまま投げ入れる

カフェンストールを含む農薬の総使用回数	ダイムロンを含む農薬の総使用回数	ピラゾキシフェンを含む農薬の総使用回数	ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数
1回	3回以内 (育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)	2回以内	<u>3回以内</u>

＜使用上の注意事項の変更・追加＞

**(2)について適用地域の記載を削除し、以下のとおり変更する。**

(2) 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイ、エゾノサヤヌカグサ、ウリカワ、ミズガヤツリは2葉期まで、ヘラオモダカ、コウキヤガラは発生始期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、シズイは草丈3 cmまで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前までが本剤の散布適期である。

