

非SU系／水稻用一発除草剤

農林水産省登録
第22142号

クサナイト[®]

粒剤

クサナイト[®]は石原産業(株)の登録商標です

特長

水田の広範囲の雑草に安定した効果を発揮!

ノビエ、コナギ等一年生雑草からホタルイ、ウリカワ等の多年生雑草まで安定した効果を示します。また、問題となっているSU抵抗性雑草やイボクサにも高い効果を示します。

2成分の非SU剤です。

プレチラクロールとピラゾキシフェン(白化作用)のコンビで、安定した効果を発揮します。

水稻に対する影響が少ない薬剤です。

周辺作物に対する影響が少なく、れんこん、いぐさ等の周辺田でも安心して使用できます。

頼りになる3キロ粒剤は草騎士!!


稻発酵粗飼料用稻(稻WCS)に使用できます。



ノビエ



コナギ



アゼナ



ホタルイ



ウリカワ



石原バイオサイエンス株式会社

非SU系／水稻用一発除草剤

農林水産省登録
第22142号

クサナイト[®] 粒剤



有効成分：
ピラゾキシフェン 6.0%
フレチラクロール 1.5%
人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しない
ものを指す)の通称)

使用量

10アール当たり 3~4kg を水の出入りを止めて均一に散布してください。

(砂壌土の水田では、所定範囲で少なめの薬量を散布してください)

ラベルを守って正しく使用しましょう!
適用作物、薬量(希釈倍数)、
使用時期、使用回数を守りましょう
石原は「食の安全」を大切にします

上手な使い方



※本剤は雑草の発生始期に効果が高いので、時期を失しないよう早めに使用してください。

(移植後30日まで)

頑固なアゼナ類やホタルイ等が問題となる水田では特に早めに使用してください。

適用雑草と使用方法

* 本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壤	使用量 (10アール当り)	使用方法	適用地帯	総使用回数 *
移植水稻	水田一年生雑草 および マツバヤ ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ヒルムシロ	移植直後 ～ノビエ2葉期 ただし、移植後 30日まで	砂壌土 ～埴土	3~4kg	湛水散布	全域 (北海道を除く) の普通期および 早期栽培地帯	本剤のみ 1回 ピラゾキシフェン剤 2回以内 フレチラクロール剤 2回以内

平成26年2月24日付の登録内容に基づいています。

使用上の注意事項


1 耕起、代かきはていねいに。

苗の植付けが均一になるように代かき
をていねいに行ってください。
未熟有機物を施用した場合は、特に
ていねいに行ってください。



2 条件の悪いところでは使用しない。

下記のような条件下では使用しないでください。
①砂質土壤の水田、漏水田(減水深2cm/日以上)
②軟弱苗を移植した水田
③極端な浅植えをした水田



3 敷布適期を守ってください。

多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布する
ように注意してください。各雑草の散布適期は以下のとおりです。

- ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ 2葉期まで
- ミズガヤツリ 発生始期まで
- ヒルムシロ 発生期

4 敷布後の水管理が重要。

散布後4~5日間は湛水状態(水深3~5cm)を保ち、田面が露出しないよう留意して
ください。また、散布後少なくとも7日間は落水やかけ流しはしないでください。



5 水産動植物に注意。

水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう
注意して使用してください。
散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。

6 使用量、使用時期、使用方法などについて。

本剤の使用にあたっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように
注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受ける
ようにしてください。

■ 使用前にラベルをよく読んでください。 ■ ラベルの記載以外には使用しないでください。 ■ 小児の手の届く所には置かないでください。 ■ 空袋は園場などに放置せず、適切に処理してください。

ISK 石原バイオサイエンス株式会社

〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目4番14号

ホームページアドレス <http://bj.ijkweb.co.jp>

取り扱い