



れんこんのアブラムシをしっかりと防除

ウララ[®] 粒剤

フロニカミド粒剤

®は石原産業(株)の登録商標です。



すぐれた浸透移行性と残効性で安定した効果が持続します。




れんこん被害



クワイクヒレアブラムシ

れんこんの アブラムシを しっかり防除



ウララ[®] 粒剤

農林水産省登録 第22307号

有効成分：フロニカミド…1.0%


人畜毒性：普通物

特 徴

- アブラムシに高い基本活性を有する新規殺虫成分フロニカミドを1%含有する粒剤です。
- 既存剤と作用機作が異なるため、既存剤の効果が低下したアブラムシにも安定した効果を示します。
- 浸透移行性にすぐれ、田面水への散布で、高い防除効果と残効性を示します。
- 天敵類、有用生物に対し、ほとんど影響はありません。
- 10アール当り3kgの薬量で高い効果が期待できます。

上手な使い方

1.れんこんのアブラムシの発生時期とウララ粒剤の使用適期(例)



2.ウララ粒剤の上手な使い方

- アブラムシ発生初期が防除適期です。アブラムシの発生が見られたら早めに散布してください。
- 10アール当り3kgを温水状態で散布してください。散布後は少なくとも7日間、落水、かけ流しはしないでください。
- 圃場にウキクサ類が発生する前に散布を心掛けてください(ウキクサが発生している場合は除去してから散布してください)。

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	10アール当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フロニカミドを含む 農薬の総使用回数
れんこん	クワイクビレアブラムシ	3kg	生育期 ただし 収穫14日前まで	2回以内	湛水散布	2回以内

※本内容は、平成21年2月10日現在の登録内容に基づいています。

⚠ 使用上の注意事項

- ・使用量にあわせて秤量し、使い切ってください。
- ・散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手が届く所には置かないでください。
- 空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。●防除日誌を記しましょう。

おなじみの「ウララ」に「粒剤」が追加
適用作物、薬量(総使用回数)、
使用時期、使用回数を守りましょう
石原は「食の安全」を大切にします