

土壌伝染性 フザリウム病菌から作物を守る！

石原

トリフミン[®] 水和剤



有効成分「トリフルミゾール」が、作物に速やかに浸達。

植付前に処理するだけで、健康な作物づくりを長くしっかりサポートします。

病害感染を、ガッチリ防ぐ！
大切な作物を、しっかり守る！



らっきょう



こんにゃく



ねぎ



たまねぎ



食用ゆり



チューリップ


特長 **1** 土壌伝染性のフザリウム病害に優れた効果があります **2** 有効成分のトリフルミゾールは、優れた浸透性を有します **3** 植付前の処理で、健全な初期生育が期待できます

■適用病害と使用方法(抜粋)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤及びトリフルミゾールを含む農薬の総使用回数	使用方法
ねぎ	萎凋病	50	—	定植直前	1 回	5~30分間 苗根部浸漬
		200	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (30×60cm、使用土壌約5ℓ) 当り1ℓ	定植前		苗床灌注
たまねぎ	乾腐病	50	—	定植直前		5分間 苗根部浸漬
		50~100	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (30×60cm、使用土壌約5ℓ) 当り0.5ℓ	定植前		苗床灌注
こんにゃく	黒球病	50	種いも1㎡当り150ml	植付前		種いもの 芽基部に散布
らっきょう						5~30分間 種球浸漬
						5分間 種球浸漬
食用ゆり	鱗茎さび症	—	—	—		種球瞬間浸漬
チューリップ	球根腐敗病	球根重量の 0.2%	—	—	—	球根粉衣

■試験成績(たまねぎ 乾腐病)

平成23年 佐賀県農業試験研究センター
品 種：ターザン
発生状況：中発生(接種)
処 理 日：12月27日(定植直前)
調 査 日：平成24年6月25日~8月7日



⚠️効果・薬害などの注意(抜粋)

- チューリップの球根粉衣に使用する場合は、適当な容器内で、球根に本剤を均一に粉衣してから植付けてください。
- 使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種にはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

⚠️安全使用上の注意

- 通常の使用方法では危険性は低いですが、誤飲、誤食などのないように注意してください。万一誤って飲み込んだ場合には、吐き出させ、安静にして直ちに医師の手当を受けさせてください。また、使用中に身体に異常を感じた場合には、安静にして直ちに医師の手当を受けてください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意し、万一眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

- 皮ふに対して弱い刺激性があるので、皮ふに付着しないように注意し、万一付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
 - 使用の際は、農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣を着用してください。作業後は顔、手足などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
 - 作業時に着用していた衣服などは他のものとは分けて洗濯してください。
 - かぶれやすい体質の人は、取扱いに十分注意してください。
 - 薬剤処理した種子は、食料・飼料に用いないよう注意してください。
 - 街路、公園などで使用する場合は、使用中および使用後(少なくとも使用当日)に、小児や使用に関係ない者が使用区域に立ち入らないよう、縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 保管：密封し、直射日光を避け、食品と区別して、小児の手の届かない、冷涼・乾燥した所に保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。

この資料は2015年9月現在の登録に基づいて作成しています。