



適用拡大

無人航空機散布
(かんしょ)

樹幹散布
(さくら クビアカツヤカミキリ)

が可能に!



〈写真はイメージです〉

害虫防除へ パワー全開!!



殺虫剤

アクセル[®] プロアブル

葉菜・根菜・樹木類を食い散らかす各種害虫に効く!



®は日本農薬(株)の登録商標

適用作物

- | | | |
|-------------------|----------|------------|
| ● うめ | ● かぶ | ● 食用ミニバラ |
| ● かんきつ | ● ねぎ | ● しょうが |
| ● キウイフルーツ | ● ほうれんそう | ● かんしょ |
| ● キャベツ | ● アスパラガス | ● さといも |
| ● はくさい | ● えだまめ | ● にんじん |
| ● レタス | ● だいず | ● ごぼう |
| ● 非結球レタス | ● とうもろこし | ● 花き類・観葉植物 |
| ● ブロッコリー | ● トマト | ● 樹木類 |
| ● 非結球あぶらな科
葉菜類 | ● ミニトマト | ● たばこ |
| ● だいこん | ● ピーマン | |
| | ● なす | |



特長

- 1 難防除害虫や既存剤抵抗性害虫に有効!
- 2 害虫からの食害を停止させます!
- 3 ローテーション防除に活用しやすい!

適用病害虫および使用方法

が2020年8月に適用拡大になりました。

<2020年8月現在の登録内容>

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数	
かんきつ	ゴマダラカミキリ	200倍	5～200ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	※1	3回以内	
	アゲハ類、ヨモギエダシヤク、クワノミハムシ	1000～2000倍	200～700ℓ/10a					
キウイフルーツ	ケムシ類	1000倍		100～300ℓ/10a		100～800ℓ/10a		
うめ	ケムシ類、クビアカツヤカミキリ		1000～2000倍					
	ケシキスイ類	1000～2000倍						
とうもろこし	アワノメイガ		1000～2000倍	100～300ℓ/10a		100～800ℓ/10a		
アスパラガス	ハスモンヨトウ	1000～2000倍						
ごぼう	ヒョウタンゾウムシ類		1000倍	100～300ℓ/10a				
トマト	オオタバコガ、ハスモンヨトウ	1000～2000倍						
ミニトマト	オオタバコガ		1000～2000倍					
ピーマン	オオタバコガ、ニジュウヤホシテントウ	1000～2000倍						
なす	ハスモンヨトウ		1000～2000倍					
にんじん	ハスモンヨトウ、ヒョウタンゾウムシ類	1000倍						
ねぎ	シロイチモジヨトウ		1000倍					
ほうれんそう	ハスモンヨトウ、シロオビノメイガ	1000～2000倍			100～300ℓ/10a			
	ウリハムシモドキ	1000倍						
キャベツ	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ	1000～2000倍						
	ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ		1000～2000倍					
はくさい	オオタバコガ、ヨトウムシ、ウババエ	1000～2000倍						
	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ		1000倍					
レタス	キスジノミハムシ、ダイコンサルハムシ	1000倍						
	非結球レタス		ヨトウムシ、ハスモンヨトウ	1000～2000倍				
ブロッコリー	コナガ	1000倍						
非結球	コナガ、キスジノミハムシ		1000倍					
あぶらな科葉菜類	ハスモンヨトウ	2000倍						
だいこん	キスジノミハムシ、ダイコンサルハムシ	1000倍	収穫7日前まで					
	ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、カブラハバチ	1000～2000倍						
かぶ	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ	1000倍	収穫3日前まで					
えだまめ	ハスモンヨトウ	1000～2000倍	収穫前日まで					
だいず	フタスジヒメハムシ	1000倍						
しょうが	ハスモンヨトウ、アワノメイガ	1000～2000倍						
	ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ	10～16倍						
かんしょ	ヨツモンカメノコハムシ	1000～2000倍	3回以内	※2	3回以内			
さといも	ハスモンヨトウ	1000～2000倍						
食用ミニバラ	オオタバコガ	1000倍	100～300ℓ/10a					
きく	オオタバコガ、シロイチモジヨトウ	1000～2000倍						
花き類・観葉植物(きくを除く)	オオタバコガ	1000倍						
樹木類(さくらを除く)	ケムシ類	1000～4000倍						
さくら	クビアカツヤカミキリ	1000倍	200～700ℓ/10a	成虫発生直前～成虫発生期	6回以内	※1	6回以内	
		200倍				5～200ℓ/10a		※3
		100倍				—		—
たばこ	ヨトウムシ	1000～2000倍	25～180ℓ/10a	収穫10日前まで	2回以内	散布	2回以内	
	タバコアオムシ	2000倍						

使用上の注意事項

※1:主幹から株元に散布 ※2:無人航空機による散布 ※3:木屑排出孔を中心に薬液が滴るまで樹幹注入

- 植物体への浸透移行による効果は弱いため、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布してください。
- クビアカツヤカミキリに使用する場合は、次の点に注意してください。
 - ・樹幹注入で使用する場合は、被害樹の加害痕である木屑排出孔の木屑を除去した後に排出孔内に薬液が滴るまで注入してください。
 - ・散布で使用する場合は、樹幹部および主枝に十分量散布してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ・ミツバチの巣箱及びその周辺にはかからないようにしてください。
 - ・関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 蜜に対して影響があるので、周辺の農薬にはかからないようにしてください。
- 無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。
 - ①散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
 - ②散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - ③少量散布の場合には、微量散布装置以外の散布器具は使用しないでください。

- ④散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
- ⑤散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- ⑥散布終了後は次の項目を守ってください。
 - ⑥使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
 - ⑦機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
- 樹幹注入の際は手袋などを着用してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも使用当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

(取扱い)


石原バイオサイエンス株式会社

〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目10番2号

 ホームページ アドレス <http://ibj.iskweb.co.jp>